



**МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ,
ДОВКІЛЛЯ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Мінекономіки**

Н А К А З

17 березня 2026 року

№ 4158

Київ

**Про державну реєстрацію
пестицидів і агрохімікатів**

Відповідно до статті 7 Закону України “Про пестициди і агрохімікати”, пунктів 20 та 23 Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295, на підставі заявок на державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів, поданих суб’єктами господарювання, та з урахуванням рекомендацій Науково-експертної ради з питань розроблення пропозицій та рекомендацій про можливість проведення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів (протокол засідання від 05.03.2026 № 2)

НАКАЗУЮ:

1. Провести державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, згідно переліку, що додається.
2. Департаменту цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Мінекономіки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом обов’язків.

Міністр

Олексій СОБОЛЕВ

7221



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
України

17 березня 2026 року № 4158

ПЕРЕЛІК
пестицидів і агрохімікатів

Інсектициди, акарициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Фламіприд, КС (флубендіамід, 350 г/л + ацетаміприд, 150 г/л) ТОВ «Група компаній «Вітагро», Україна	0,15 – 0,2	Кукурудза	Кукурудзяний (стебловий) метелик, лучний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації	14	2
		0,15 – 0,2	Соняшник	Попелиці, лускокрилі, соняшникова щитоноска	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,2	Соя	Лускокрилі, клопи, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	1
2.	Міст Супер, ФК (тіаметоксам, 126 г/л + лямбда-цигалотрин, 95 г/л) Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	0,18	Буряки цукрові	Звичайний буряковий довгоносик, сірий довгоносик, бурякові блішки, щитоноски, мідяк піщаний, листкова бурякова попелиця	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,2 – 0,24	Зернові колосові культури	Хлібні жуки, хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п'явиці	Обприскування в період вегетації	30	2
3.	ЛОК-5, КЕ (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	0,15	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, стебловий ріпаковий прихованохоботник, капустяна попелиця, ріпаковий пильщик	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,20	Зернові колосові культури	Хлібні жуки, хлібні клопи, злакові попелиці, трипси, п'явиці	Обприскування в період вегетації	30	2
4.	ДРАГУН ЕС, КЕ (хлорпірифос, 480 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,0 – 1,2	Пшениця озима	Злакові мухи, попелиці, п'явиці, хлібна жужелиця	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,8 – 1,2	Соя	Листогризучі совки, соєва плодожерка, тютюновий трипс, акацієва вогнівка	Обприскування в період вегетації	30	1
		2,0 – 2,5	Буряки цукрові	Довгоносики, совки, крихітка, щитоноски	Обприскування на початку появи сходів	30	1
		0,5 – 0,6	Ріпак	Довгоносики, совки, крихітка, щитоноски, блішки, попелиця листкова	Обприскування в період вегетації	30	2
		2,0	Яблуня	Плодожерки, листовійки, міль, кліщі, попелиці	Обприскування в період вегетації	40	2
5.	ЛАМДЕКС®, СК (лямбда-цигалотрин, 50 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна	0,15	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, п'явиці, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,2	Пшениця озима	Хлібні жуки, трипси, блішки	Обприскування в період вегетації	30	1
		0,15	Ріпак	Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд, білани, клопи, попелиці	Обприскування в період вегетації	14	2
		0,4	Яблуня	Яблунева плодожерка, садові трубноверти (казарка, букарка), попелиці, листовійки	Обприскування в період вегетації	14	2
		0,32 – 0,48	Виноградники	Павутинні кліщі	Обприскування в період вегетації	20	1
				Гронова листовійка		30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,2	Кукурудза	Стебловий кукурудзяний метелик	Обприскування в період вегетації	30	1
6.	ІЛ-стар, КС (імідаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	0,5	Яблуня, груша	Плодожерки, листовійки, попелиці	Обприскування в період вегетації	30	2
7.	Штефотрута, КЕ (хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	1,0	Пшениця озима	П'явиці, клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	30	1
		1,0 – 1,5	Буряки цукрові	Звичайний буряковий довгоносик, бурякові блішки, бурякові щитоноски, мінуюча муха	Обприскування в період вегетації	40	1
8.	Ацетакен, ВП (ацетаміприд, 200 г/кг) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	0,10 – 0,12	Пшениця, ячмінь	Хлібна жужелиця, п'явиці, попелиці, хлібні клопи-черепашки, хлібні жуки	Обприскування у період вегетації	30	2
		0,10 – 0,12	Ріпак	Хрестоцвіті попелиці, блішки, хрестоцвіті клопи	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,05 – 0,075	Буряки цукрові	Попелиці, щитоноски	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,15 – 0,20	Яблуня	Попелиці, листовійки, плодожерки	Обприскування в період вегетації	45	2
9.	Альфагард 100, КЕ (альфа-циперметрин, 100 г/л) Гарда Кемікалз Лтд. (Gharda Chemicals Ltd.), Індія	0,1 – 0,15	Пшениця	Шкідлива черепашка	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,1	Пшениця	Попелиці, трипси, п'явиця, злакові мухи	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,15	Ріпак	Квіткоїд ріпаківий, блішки хрестоцвіті	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,1 – 0,15	Виноградники	Листовійки	Обприскування в період вегетації	30	1 – 2
		0,15 – 0,25	Яблуня	Плодожерки, листовійки	Обприскування в період вегетації	45	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Хлоргард 480, КЕ (хлорпірифос, 480 г/л) Гарда Кемікалз Лтд. (Gharda Chemicals Ltd.), Індія	0,8	Буряки цукрові	Бурякова листкова попелиця	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,5	Буряки цукрові	Бурякові блішки	Обприскування в період вегетації	30	2
		2,5	Буряки цукрові	Буряковий довгоносик	Обприскування в період вегетації	30	2
		1,5	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	30	2
		2,0	Яблуна	Яблунева плодожерка	Обприскування в період вегетації	40	2
11.	*ІМЕКСАБ ФОРТЕ, КЕ (абамектин, 1,8%) ТОВ «КОМПАНІЯ «ІМЕКС АГРО», Україна	0,4	Соя	Звичайний павутинний кліщ	Обприскування в період вегетації	30	1
12.	Просенс, ВГ (емаектин бензоат 100 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	0,2 – 0,25	Ріпак озимий	Капустяна міль, хрестоцвітні блішки, попелиці, совки	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2 – 0,25	Соняшник	Попелиці, вогнівки, бавовникова совка, соняшникова шипоноська	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,2 – 0,25	Кукурудза	Кукурудзяний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації	30	2
13.	Ветеран, РК (ацетаміпрід, 200 г/л) ТОВ «Нертус Лтд», Україна	0,1 – 0,15	Соняшник	Попелиці, тютюновий трипс, буряковий довгоносик, саранові	Обприскування в період вегетації	35	1
		0,10 – 0,12	Ріпак озимий та ярий	Ріпаковий квіткоїд, хрестоцвітні блішки, попелиця, хрестоцвітний клоп, прихованохоботник капустяний насіннєвий, капустяна стручкова галиця, оленка волохата	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,15 – 0,20	Яблуня	Попелиці, яблунева та мінуюча міль, розання і сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,25		Яблунева плодожерка (з відродженням I – II генерації)	Обприскування в період вегетації		2
		0,4 – 0,5		Каліфорнійська та інші види щитівки, оленка волохата	Обприскування в період вегетації		2
14.	Бархан, РК (ацетаміпрід, 200 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	0,1 – 0,15	Соняшник	Попелиці, тютюновий трипс, буряковий довгоносик, саранові	Обприскування в період вегетації	35	1
		0,10 – 0,12	Ріпак озимий та ярий	Ріпаківий квіткоїд, хрестоцвіті блішки, попелиця, хрестоцвітий клоп, прихованохоботник капустяний насіннєвий, капустяна стручкова галиця, оленка волохата	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,15 – 0,20	Яблуня	Попелиці, яблунева та мінуюча міль, розання і сітчаста листокрутки, яблуневий пильщик	Обприскування в період вегетації	45	2
		0,25		Яблунева плодожерка (з відродженням I – II генерації)	Обприскування в період вегетації		2
		0,4 – 0,5		Каліфорнійська та інші види щитівки, оленка волохата	Обприскування в період вегетації		2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Неріо, КС (Nerio, SC) (абамектин, 40 г/л + спіротетрамат, 240 г/л) ТОВ «МЕГАПОЛІС ЕКСІМ», Україна	0,25 – 0,35	Яблуня	Листоблішки, яблуневі і грушеві, попелиці (в т.ч. кров'яні), щитівки (у т.ч. каліфорнійські) і несправжньощитівки	Обприскування в період вегетації <i>(Для яблук – не застосовувати до опадання пелюсток. Для груш – не застосовувати до того, як плоди досягнуть 10 мм в діаметрі)</i>	20	3
		0,25 – 0,35	Груша			20	3
		0,3 – 0,5	Соя	Звичайний павутинний кліщ, клопи, білокрилка (у т.ч. тютюнова), попелиці, трипси	Обприскування в період вегетації	50	2
16.	Кентіам, ФК (Kentiam, ZC) (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	0,18	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,25 – 0,4		Хлібна жужелиця (турун) – личинки молодшого віку			1
		0,18 – 0,22	Ячмінь ярий	Злакові мухи, цикадки, п'явиці, попелиці, трипси, блішки, ячмінний мінер	Обприскування в період вегетації	35	1
		0,18	Соняшник	Геліхризова попелиця, шипоноса соняшникова	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18	Буряки цукрові	Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листова бурякова попелиця	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18	Томати	Колорадський жук, велика картопляна попелиця	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,18	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,18	Яблуня	Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач (пильщик), яблунева зелена попелиця	Обприскування в період вегетації	20	2
17.	Хадесон, ФК (Hadeson, ZC) (лямбда-цигалотрин, 106 г/л + тіаметоксам, 141 г/л) ТОВ «МЕГАПОЛІС ЕКСІМ», Україна	0,18	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, попелиці, трипси, цикадки	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,25 – 0,4		Хлібна жужелиця (турун) – личинки молодшого віку			1
		0,18 – 0,22	Ячмінь ярий	Злакові мухи, цикадки, п'явиці, попелиці, трипси, блішки, ячмінний мінер	Обприскування в період вегетації	35	1
		0,18	Соняшник	Геліхризова попелиця, шипоноса соняшникова	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18	Буряки цукрові	Звичайний та сірий бурякові довгоносики, щитоноски, блішки, листкова бурякова попелиця	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,18	Томати	Колорадський жук, велика картопляна попелиця	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,18	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,18	Яблуня	Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблуневий трач (пильщик), яблунева зелена попелиця	Обприскування в період вегетації	20	2
18.	Наповал, КС (імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	0,1 – 0,15	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2
		0,1 – 0,15	Пшениця озима	Клоп шкідлива черепашка, трипси, п'явиці, попелиці, блішки, цикадки	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Фітоверм (Фитоверм) ЕС, КЕ (абамектин, 18 г/л) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРО ПРОТЕКШН», Україна	1,0 – 1,5	Яблуня, виноград томати, огірки	Павутинні кліщі (глодовий, туркестанський павутинний, червоний плодовий і бурий плодовий кліщі)	Обприскування в період вегетації	10	2
20.	RembeK ONE (РембеК ONE), ПР (ацетаміпрід, 1 г/кг) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРО ПРОТЕКШН», Україна	3,0 – 7,0	Картопля, томати (відкритого та закритого ґрунту), огірки (відкритого та закритого ґрунту)	Медведка, дрітняки, личинки травневого хруща, садові мурахи	Розкладання при появі шкідників	-	2
21.	Таурус, ЗП (піридабен, 200 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,5 – 0,9	Яблуня	Кліщі	Обприскування в період вегетації	20	1
		0,5 – 0,9	Виноградники			30	1
22.	АСТОВЕРМ (АКТОВЕРМ) ЕС, КЕ (абамектин, 18 г/л) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна; ПП «БТУ-Центр», Україна	0,2 – 1,5	Пшениця озима	Попелиці, трипси, блішки	Обприскування в період вегетації	30	2 – 3
			Горох, соя	Попелиці, трипси, кліщі, довгоносики		30	
			Суніці	Кліщі, попелиці, довгоносики		14	
			Томати та огірки (відкритого й закритого ґрунту)	Кліщі, попелиці, трипси, білокрилка		14 (відкритий ґрунт) 7 (закритий ґрунт)	



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Асгард, РК (мепікват-хлорид, 290 г/л + метконазол, 42 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,5 – 1,0	Ріпак	Альтернативіоз, фомоз, інші плямистості, регуляція ростових процесів	Обприскування в період вегетації (від 4-х листків до висоти 30 см)	50	2
2.	Ріальт, КС (піраклостробін, 300 г/л + боскалід, 200 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,75	Ріпак	Склеротиніоз, альтернативіоз, фомоз, фомопсидоз	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	30	2
3.	Сінан, КС (піраклостробін, 130 г/л + дифеноконазол, 130 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,5 – 1,0	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Септоріоз, піренофороз, борошниста роса, фузаріоз, бура іржа, сітчаста та темно-бура плямистість	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	40	2
		0,5 – 1,0	Соняшник	Фомоз, фомопсидоз, альтернативіоз, септоріоз, іржа, склеротиніоз, сіра гниль, борошниста роса, пероноспороз	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	35	2
		0,5 – 1,0	Соя	Аскохітоз, антракноз, септоріоз, церкоспороз, альтернативіоз, борошниста роса, пероноспороз (превентивно)	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	45	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,5 – 0,75	Ріпак	Альтернаріоз, фомоз, склеротиніоз, циліндроспоріоз, борошниста роса, сіра гниль, пероноспороз (превентивно)	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	50	2
4.	Інспір Голд, КЕ (тебуконазол, 200 г/л + Протіконазол, 100 г/л) ТОВ «Укрвіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,0 – 1,25	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз колосу, піренофороз, септоріоз листя, борошниста роса, іржа (види)	Обприскування в період вегетації (профілактично та за перших ознак прояву хвороб)	40	2
5.	*Боско/Бостанг, ВГ (боскалід, 500 г/кг) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,2 – 0,3	Соя	Пероноспороз, фомоз, коренева гниль	Обприскування в період вегетації	45	3
		0,2 – 0,3	Соняшник	Пероноспороз, сіра гниль, фомоз, альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	45	3
6.	Альпіна/Інстар, КС (азоксистробін, 200 г/л+ ципроконазол, 80 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,75 – 1,0	Соняшник	Пероноспороз, борошниста роса, фомоз, фомопсис, іржа	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,5 – 0,75	Кукурудза	Летюча сажка, фузаріоз, гельмінтоспоріоз, пліснявіння зернівок	Обприскування в період вегетації	-	2
		0,5 – 0,75	Буряки цукрові	Борошниста роса, пероноспороз, цереоспороз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	-	2
7.	Табс/Табулін, ЕВ (тебуконазол, 250 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,8 – 1,0	Пшениця озима	Летюча та тверда сажки, септоріоз, кореневі гнилі	Обприскування в період вегетації	30	2
8.	*Баракуда, ВГ (боскалід, 500 г/кг) ТОВ «Група компаній «Вітагро», Україна	0,2 – 0,3	Ріпак озимий	Альтернаріоз, склеротиніоз, фомоз	Обприскування в період вегетації	35	3
		0,5	Соняшник	Альтернаріоз, склеротиніоз (біла гниль), фомоз	Обприскування в період вегетації	35	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	*Ньютон, КС (боскалід, 150 г/л + дифенокназол, 150 г/л + піраклостробін, 100 г/л) ТОВ «Група компаній «Вітагро», Україна	0,7 – 0,8	Соя	Склеротиніоз, антракноз, пероноспороз, септоріоз	Обприскування в період від фази бутонізації до фази формування бобів	50	2
		0,7 – 0,8	Соняшник	Склеротиніоз, фомоз, фомопсис, альтернاریоз, іржа	Обприскування в період від фази бутонізації «зірочка» до фази кінець цвітіння	35	2
		0,8 – 1,0	Ячмінь озимий	Фомоз, фомопсис, септоріоз, альтернاریоз, склеротиніоз, іржа	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,8	Ячмінь ярий	Іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса, фузаріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Кукурудза	Фомоз, альтернاریоз, біла та сіра гнилі	Обприскування в період вегетації	30	2
10.	Флюксис, КС (Fluxis, SC) (азоксистробін, 250 г/л + флутриафол, 125 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,5 – 0,75	Пшениця	Септоріоз, борошниста роса, бура та жовта іржа, піренофороз, фузаріоз колосу	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,5 – 0,75	Соя	Іржа, пероноспороз, септоріоз, склеротиніоз альтернاریоз, фузаріозне в'янення	Обприскування в період вегетації	35	2
		0,6 – 1,0	Соняшник	Фомоз, фомопсис; іржа; пероноспороз, склеротиніоз, септоріоз, іржа, альтернاریоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6 – 1,0	Ріпак	Фомоз, альтернاریоз, склеротиніоз, пероноспороз, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	2
11.	АЛЛІГАТОР SC, КС (хлорокис міді, 700 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,75 – 1,0	Соя	Несправжня борошниста роса, фузаріоз, іржа	Обприскування в період вегетації	30	3
12.	АСПЕКТ WP, ЗП (манкоцеб, 800 г/кг) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,6	Картопля	Суха плямистість (альтернاریоз), фітофтороз	Обприскування в період вегетації	20	2
		1,6	Томати		Обприскування в період вегетації	14	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	КОМПОЗИТ SC, КС (карбендазим, 500 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,5	Пшениця озима	Септоріоз листя і колосу, борошниста роса, піренофороз	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	30	2
		0,3 – 0,4	Буряки цукрові	Церкоспороз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	20	2
		1,5	Соняшник	Біла та сірі гнилі, фомоз	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	30	1
14.	ТебАз Стар, КС (тебуконазол, 200 г/л+ азоксистробін, 120 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	1,0 – 1,2	Кукурудза	Іржа, гельмінтоспоріоз	Обприскування посівів в період вегетації	50	1
		1,0 – 1,2	Соняшник	Фомоз фомопсидоз, борошниста роса, септеріоз, іржа, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування посівів в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Зернові колосові культури	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз	Обприскування посівів в період вегетації	30	2
15.	Кеназо, КС (тебуконазол, 200 г/л+ азоксистробін, 120 г/л) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	1,0 – 1,2	Кукурудза	Іржа, гельмінтоспоріоз	Обприскування посівів в період вегетації	50	1
		1,0 – 1,2	Соняшник	Фомоз фомопсидоз, борошниста роса, септеріоз, іржа, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування посівів в період вегетації	30	2
		0,8 – 1,0	Зернові колосові культури	Септоріоз, борошниста роса, бура листкова іржа, фузаріоз і септоріоз колосу, альтернаріоз	Обприскування посівів в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	*Джульетта (Julietta) фунгіцид біологічного походження (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> LAS02, 961 г/кг (96,1%)) АС КРОП Сп. з о.о.о. Польща	2,5	Суниця	Альтернаріоз, біла плямистість, бура плямистість, сіра гниль ягід	Обприскування посівів в період вегетації	-	5
17.	КАЗУМІН 8Л, РК (продукт ферментації <i>Streptomyces kasugaensis</i> , 80 г/л) Хокко Кемікал Індастріз Ко., Лтд., Японія	0,35 – 0,75	Томати	Бактеріальні хвороби: бактеріальна плямистість, чорна бактеріальна плямистість, мокра гниль плодів та ін.	Обприскування в період вегетації	-	3
		0,35 – 0,75	Капуста	Бактеріальні хвороби: слизистий бактеріоз, судинний бактеріоз, бактеріальна плямистість та ін.	Обприскування в період вегетації	-	3
		0,75 – 1,0	Яблуна, груша	Бактеріальний опік, парша	Обприскування в період вегетації	-	3
18.	Флінт 50 WG, ВГ (трифлуксистеробін, 500 г/кг) Байер АГ, Німеччина	0,25	Виноградники	Оїдіум, чорна гниль	Обприскування в період вегетації профілактично	30	3
		0,15	Яблуна	Парша, борошниста роса	Обприскування в період вегетації (профілактично або за перших ознак прояву хвороб)	20	3
19.	Нукон 25 Хай Біо, ВГ (Nucor 25 Hi Bio, WG) (міді хлороксид, 423,7 г/кг) Альбау Юроп Сарл (Albaugh Europe Sarl), Швейцарія	2,5 – 3,0	Томати	Фітофтороз	Обприскування в період вегетації	20	3 – 5
		2,0	Огірки	Пероноспороз	Обприскування в період вегетації	20	3 – 5
		2,5 – 3,0	Яблуна	Парша, рак стовбура	Обприскування в період вегетації	20	2 – 4
		2,5 – 3,0	Виноградники	Мілдью	Обприскування в період вегетації	30	4 – 8



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	Рекс® Про, СЕ (мефентрифлуконазол, 150 г/л + фенпропіморф, 400 г/л) БАСФ Агро Б.В., Швейцарія	0,4 – 0,7	Пшениця яра та озима	Септоріоз листя та колосу, види іржі, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,7	Ячмінь ярий та озимий	Сітчаста, смугаста і темно-бура плямистості, ринхоспоріоз, види іржі, борошниста роса, рамуляріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
21.	Дайфеназокс, КС (дифеноконазол, 430 г/л) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	0,2 – 0,3	Пшениця	Іржа, септоріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	35	3
		0,25 – 0,3	Соняшник	Альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	35	3
		0,25 – 0,3	Ріпак	Альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	35	3
		0,12	Яблуна	Борошниста роса	Обприскування в період вегетації	35	3
22.	Діканто, КС (дифеноконазол, 210 г/л + азоксистробін, 210 г/л) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	0,5 – 0,6	Пшениця	Іржа, септоріоз, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,5 – 0,6	Соя	Борошниста роса, септоріоз, пероноспороз, антракноз, аскохітоз, альтернаріоз, церкоспороз	Обприскування в період вегетації	40	2
		0,5 – 0,6	Соняшник	Альтернаріоз, фомоз, іржа, септоріоз, фомопсис, біла гниль	Обприскування в період вегетації	50	2
		0,5 – 0,6	Ріпак	Фомоз, альтернаріоз, циліндроспоріоз, склеротініоз, сіра гниль, борошниста роса	Обприскування в період вегетації	50	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	Пікогарт, КС (Pikogard, SC) (ципроконазол, 80 г/л + пікоксістробін, 200 г/л) Іфагрі Лтд (Ifagri Ltd), Великобританія	0,5 – 0,75	Пшениця озима	Борошниста роса, бура іржа, жовта іржа, піренофороз, темно-бура плямистість, фузаріоз, септоріоз листя та колосу, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (перше – профілактичне або при появі перших ознак одного із захворювань, наступне – при необхідності з інтервалом 14 днів; проти фузаріозу колоса – кінець колосіння – початок цвітіння)	35	2
		0,5 – 0,75	Соя	Пероноспороз, церкоспороз, септоріоз, аскохітоз, антракноз, фузаріоз, склеротиніоз, борошниста роса, іржа, фузаріоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації (бутонізація – початок цвітіння)	35	2
		0,5 – 0,75	Буряки цукрові	Фомоз, церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа, рамуляріоз	Обприскування в період вегетації	35	1
		0,75 – 1,0	Кукурудза	Пухирчаста сажка, фузаріозно- гельмінтоспоріозна гниль стебла, цвіль качанів, гельмінтоспоріоз (види), іржа	Обприскування в період вегетації (видиме утворення міжвузлів – викидання волоті – цвітіння)	35	1
		0,5 – 1,0	Соняшник	Біла та сіра гнилі, ризопус, септоріоз листя, альтернаріоз, фомоз, фомопсис, іржа, пероноспороз, склеротиніоз, несправжня борошниста роса	Обприскування в період вегетації (6 – 8 листків або при висоті рослини 60 – 80 см)	50	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,5 – 1,0	Ріпак ярий	Фомоз, склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації (при появі перших ознак захворювання або початку утворення стручків)	40	1
		0,5 – 1,0	Ріпак озимий	Фомоз, склеротиніоз, сіра гниль, альтернаріоз, циліндроспоріоз	Обприскування в період вегетації (восени у фазі 5 – 6 листків, навесні – у фазі росту стебла)	40	2
24.	Кенерзін, КС (Kenerzin, SC) (карбендазим, 500 г/л) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	0,4 – 0,5	Пшениця яра та озима, ячмінь ярий та озимий, жито озиме	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6	Ріпак ярий та озимий	Альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,3 – 0,4	Буряки цукрові, буряки кормові	Церкоспороз	Обприскування в період вегетації	20	2
25.	Десфілар, ЗП (цимоксаніл, 45 г/кг + манкоцеб, 680 г/кг) ТОВ «Альфа Смарт Агро», Україна	2,0 – 2,5	Картопля	Фітофтороз, альтернаріоз, макроспоріоз	Обприскування в період вегетації	14	3
26.	Айрон, ЗП (сульфат заліза (FeSO ₄) – 53%) ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна	6,0 – 18,0	Яблуня	Парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моніліоз, мохи, лишайники	Обприскування в період вегетації (обприскування дерев з верхньої частини крони, переходячи на нижню, не частіше, ніж через 15 діб при наявності мохів та лишайників, а також при появі перших ознак захворювань)	60	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		10,0 – 15,0	Смородина	Борошниста роса, септоріоз, бокальчаста іржа, антракноз, мохи, лишайники	Обприскування в період вегетації (суцільне обприскування кущів, не частіше, ніж через 15 діб при наявності мохів та лишайників, а також при появі перших ознак захворювань)	60	2
		15,0 – 18,0	Виноград	Мільдю, борошниста роса, антракноз, бактеріальний рак, чорна плямистість, сіра гниль	Обприскування в період вегетації (обприскування з верхньої частини крони, переходячи на нижню при появі перших ознак захворювань)	60	2
27.	БОРДО МК, ВП (сульфат міді (CuSO_4) – 85 – 98%) ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна	15,0 – 18,0	Яблуня	Парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моніліоз	Обприскування навесні, до розпускання бруньок, або восени, після опадання листя 1 – 2% водним розчином	14	2
		15,0 – 18,0	Абрикос	Клястероспоріоз, кокомікоз, моніліоз, борошниста роса, бактеріальний рак	Обприскування навесні, до розпускання бруньок, або восени, після опадання листя 1 – 2% водним розчином	14	2
		0,9 – 1,0	Томати	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період бутонізації 0,1% водним розчином	14	2
28.	Альтосан, КЕ (пропіконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л) ТОВ «Техноторг-Дон», Україна	0,4 – 0,5	Пшениця озима	Септоріоз листя і колоса, піренофороз, борошниста роса, іржа, церкоспорельоз, фузаріоз колоса	Обприскування в період вегетації	30	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Форсаж 500 SC, КС (карбендазим, 500 г/л) ТОВ «Агросфера-Трейд», Україна	0,4 – 0,5	Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,5	Ячмінь ярий та озимий	Борошниста роса, плямисті листя	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,5	Жито озиме	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,3 – 0,4	Буряки цукрові та кормові	Церкоспороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6	Ріпак озимий та ярий	Альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	45	2
30.	Карбекс, КС (карбендазим, 500 г/л) ТОВ «Агросфера-Трейд», Україна	0,4 – 0,5	Пшениця яра та озима	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,5	Ячмінь ярий та озимий	Борошниста роса, плямисті листя	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,4 – 0,5	Жито озиме	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,3 – 0,4	Буряки цукрові та кормові	Церкоспороз	Обприскування в період вегетації	30	2
		0,6	Ріпак озимий та ярий	Альтернаріоз, септоріоз	Обприскування в період вегетації	45	2
31.	Ацидан, ЗП (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	2,0	Виноградники	Мілдью, чорна плямистість, сіра гниль	Обприскування в період вегетації	30	3
32.	Стробітек, РГ (кресоксим-метил, 500 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,3	Виноградники	Оїдіум, мілдью	Обприскування в період вегетації	50	3
33.	Джоуст, КЕ (протіоконазол, 250 г/л) Нуфарм Юроп ГмбХ, Німеччина; ТОВ «Нуфарм Україна», Україна	0,6 – 0,8	Пшениця озима	Хвороби колоса (фузаріоз, септоріоз, альтернаріоз)	Обприскування в період вегетації (під час цвітіння (ВВСН 61-69))	35	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	Косайд® 4000, ВГ (гідроксид міді, 538 г/кг) Cosaco LLC, США	1,5 – 2,0	Виноградники	Мілдью	Обприскування в період вегетації	30	4
		1,5 – 2,0	Томати	Фітоспороз, макроспоріоз, септоріоз, альтернаріоз	Обприскування в період вегетації	14	4
		2,0 – 2,5	Яблуна	Парша, філlostиктоз	3 профілактичні обробки з інтервалом 7 – 14 днів	30	3
		4,0 – 6,0	Персики	Курчавість	Обприскування у фазі набрякання бруньок	30	2
		2,0 – 3,0			Обприскування у фазі розпускання бруньок («мишачі вушка»)		
		2,0	Цибуля	Пероноспороз, бактеріоз	Обприскування в період вегетації	14	4
		1,5 – 2,5	Картопля	Альтернаріоз, фітофтороз	Обприскування в період вегетації	20	3
		2,0 – 3,0	Черешня	Моніліоз, клястероспоріоз	Обприскування в період вегетації	20	3
		1,5 – 2,5	Соя	Кутаста плямистість, бактеріальний опік	Обприскування в період вегетації	30	3
35.	Снукер, КС (метконазол, 60 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,75 – 1,25	Ріпак озимий	Фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз	Обприскування в період вегетації	50	1
		1,0 – 1,5	Пшениця озима	Фузаріоз, іржа, септоріоз	Обприскування в період вегетації	30	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для протруювання насіння

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Ветеран, РК (ацетаміприд, 200 г/л) ТОВ «Нертус Лтд», Україна	0,5 – 0,7	Пшениця озима, ячмінь озимий та ярий	Личинки пластинчатовусих, дротяники, хлібний турун, злакові мухи, цикадки, попелиці	Протруювання насіння перед висіванням
2.	Бархан, РК (ацетаміприд, 200 г/л) ТОВ «Акваріус і К», Україна	0,5 – 0,7	Пшениця озима, ячмінь озимий та ярий	Личинки пластинчатовусих, дротяники, хлібний турун, злакові мухи, цикадки, попелиці	Протруювання насіння перед висіванням
3.	МВІ 306, КС (інактивовані клітини штаму <i>Burkholderia rinojensis</i> A396 і відпрацьоване ферментаційне середовище – 94,46%) Про Фарм Груп, Інк. (Pro Farm Group, Inc.), США	40 – 100 мл/ 100 кг насіння	Кукурудза	Ґрунтові комахи: <i>Diabrotica virgifera</i> (західний кукурудзяний жук), <i>Agriotes spp</i> (дротяники). Ґрунтові нематоди: <i>Pratylenchus spp</i> (кореневі нематоди)	Протруювання насіння перед висіванням
		40 – 100 мл/ 100 кг насіння	Соняшник	Ґрунтові комахи: <i>Agriotes spp</i> (дротяники)	Протруювання насіння перед висіванням
		40 – 100 мл/ 100 кг насіння	Соя	Ґрунтові комахи: <i>Agriotes spp</i> (дротяники). Ґрунтові нематоди: <i>Pratylenchus spp</i> (кореневі нематоди), <i>Meloidogyne spp</i> (галові нематоди)	Протруювання насіння перед висіванням



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		40 – 100 мл/ 100 кг насіння	Ріпак озимий та ярий	<i>Psylliodes spp</i> (ріпакові блішки), <i>Phyllotreta spp</i> (хрестоцвіті блішки), <i>Delia radicum</i> (весняна капустяна муха), <i>Agriotes spp</i> (дротяники)	Протруювання насіння перед висіванням
		20 – 100 мл/ 100 кг насіння	Зернові культури озимі та ярі (пшениця, ячмінь, овес, тритикале, жито)	Ґрунтові комахи: <i>Agriotes spp</i> (дротяники), <i>Delia coarctata</i> (озима муха), <i>Zabrus tenebrioides</i> (жужелиця хлібна/турун хлібний)	Протруювання насіння перед висіванням
4.	Максеміс, ТН (Maxemis, FS) (дифенокназол, 25 г/л + флудіоксоніл, 25 г/л + тіаметоксам, 262,5 г/л) Іфаґрі Лтд (Ifagri Ltd), Великобританія	1,5 – 2,0	Пшениця озима	Летюча сажка, фузаріозно- гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз. Хлібна жужелиця, злакові мухи, хлібні блішки, попелиці, цикадки	Протруювання насіння перед висіванням
		1,5 – 2,0	Ячмінь ярий	Летюча та кам'яна сажки, фузаріозно- гельмінтоспоріозна коренева гниль гельмінтоспоріоз, борошниста роса, карликова іржа. Підгризаючі та ґрунтові шкідники, хлібні блішки, п'явиці, попелиці, цикадки	Протруювання насіння перед висіванням
		1,0	Соя	Фузаріоз, аскохітоз. Ґрунтові шкідники	Протруювання насіння перед висіванням



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		0,5 – 0,7	Картопля	Комплекс хвороб (ризиктоніоз, альтернаріоз, парша срібляста і звичайна, фузаріоз). Комплекс ґрунтових шкідників та шкідників сходів (дротяники, личинки хрущів, капустянки, несправжньодротяники, попелиці, колорадський жук)	Обробка бульб перед висаджуванням
5.	Даліла 600, ТН (імідаклоприд 600 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	5,0 – 9,0	Кукурудза	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Протруювання насіння перед висіванням
		8,0	Соняшник	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Протруювання насіння перед висіванням
		40 – 70 мл/п.о.	Буряки цукрові	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Протруювання насіння перед висіванням
		0,4 – 0,5	Ячмінь	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Протруювання насіння перед висіванням
		0,5 – 1,0	Пшениця	Комплекс ґрунтових та наземних шкідників сходів	Протруювання насіння перед висіванням

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження
1	2	3	4	5	6
1.	Кенерзін, КС (Kenerzin, SC) (карбендазим, 500 г/л) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	1,0 – 1,2	Пшениця	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	Протруювання насіння перед висіванням
		1,0 – 1,2	Ячмінь	Кореневі гнилі, снігова пліснява, сажкові хвороби	Протруювання насіння перед висіванням
		0,8	Соняшник	Біла і сіра гнилі, фомоз, пліснявіння	Протруювання насіння перед висіванням



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
2.	Лайвіт, ТН (протіоконазол, 50 г/л + дифеноконазол, 50 г/л + піраклостробін, 25 г/л) ТОВ «Укрівіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,75 – 1,2	Зернові колосові культури:	Сажка (карликова, летюча, тверда, кам'яна), пліснявіння насіння, кореневі та прикореневі гнилі, борошниста роса, септоріоз, плямистості листя ячменю на початкових етапах росту	Протруювання насіння перед висіванням
3.	Ультрасил Duo, ТН (тебуконазол, 60 г/л + імазаліл, 100 г/л) ТОВ «Укрівіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,5	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Сажкові хвороби, борошниста роса, кореневі гнилі, пліснявіння насіння, сітчаста плямистість, септоріоз	Протруювання насіння перед висіванням
4.	*Протрікс Ультра, ТН (протіоконазол, 200 г/л + металаксил-М, 40 г/л) ТОВ «Група Компаній «Вітагро», Україна	0,4 – 0,5	Соя	Пліснявіння насіння, комплекс корневих гнилей, аскофітоз, антракноз, пероноспороз	Протруювання насіння перед висіванням
5.	ЦЕНЗОР XL FS, ТН (дифеноконазол, 33,7 г/л + металаксил-М, 2,7 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,5 – 2,0	Пшениця озима	Кореневі гнилі, септоріоз, снігова пліснява, сажкові хвороби	Протруювання насіння перед висіванням
6.	*Вайрос Старт, ТН (флудіоксоніл, 25 г/л + металаксил-М, 10 г/л) ПП «Картал Про», Україна	1,0	Соя, горох	Пліснявіння насіння, фузаріозна коренева гниль, пероноспороз, аскохітоз	Протруювання насіння перед висіванням



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для боротьби зі шкідниками запасів

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/м ² , г/м ³ г/т, мл/м ² , мл/м ³ мл/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Квікфос (Quickphos), ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ЮПЛ Холдінг Кооператів Ю.А., Нідерланди	1 – 3 табл./м ³	Незавантажені складські приміщення	Шкідники запасів	Фумігація за температури: 5 – 10°C з експозицією 10 діб, при температурі 11 – 15°C з експозицією 7 діб, при 16 – 20°C – 6 діб, при 21 – 25°C – 5 діб, вище 25°C – 4 доби. Допуск людей в оброблені приміщення можливий після повного провітрювання (2 – 5 діб) та вмісту фосфіну в повітрі робочої зони не вище ГДК. Реалізація продукції можлива через 20 діб після фумігації, якщо вміст залишкових кількостей фосфіну в продукції не буде перевищувати МДР	1
		1 – 3 табл./м ³	Зерно хлібних злаків, зернових колосових, зернобобових, олійних культур та продукція їх переробки затарене в мішки, коробки			
		3 – 5 табл./т продукту	Зерно хлібних злаків, зернових, колосових, зернобобових, олійних культур та продукція їх переробки насипом в трюмах, складських приміщеннях, контейнерах, рухомий склад (вагони, причепа)			
		3 – 5 табл./т продукту	Обробка лісу (деревини), в трюмах, контейнерах, складах	Дереворуйнівники та підкорові шкідники		
2.	Фуміфос, ТБ (фосфід алюмінію, 560 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	9 г/т або 3 табл. (3 г фосфіну) / т зерна	Складські приміщення	Шкідники запасів	Фумігація за температури: 5 – 10°C – експозиція 10 діб, при 11 – 15°C – 7 діб, при 16 – 20°C – 6 діб, при 21 – 25°C – 5 діб. Дегазація – мін. 10 діб.	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Гербициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Експрес Голд 75, ВГ (трибенурон-метил, 562,5 г/кг+ тифенсульфурон-метил, 187,5 г/кг) ТОВ «ФМС Україна», Україна	30 – 40 г/га + ПАР «Тренд 90» – 200 мл/га (норма 40 г/л застосовується при переростанні бур'янів)	Соняшник (гібриди стійкі до кайштрибенурону та тифенсульфурону)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у період вегетації у фазі 2 – 6 листків у культури	-	1
2.	Агент, СЕ (2,4-дихлорфеноксистої кислоти 2-етилгексиловий ефір, 452 г/л + флорасулам, 6,25 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,6	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2.4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні види	Обприскування від початку фази кущення до утворення 1 – 2 міжвузля культури (ВВСН 21-32)	-	1
		0,4 – 0,6	Просо	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2.4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні види	Обприскування від початку фази кущення до виходу в трубку культури	-	1
		0,4 – 0,6	Сорго	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2.4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні види	Обприскування у фазі 3 – 5 листків культури (ВВСН 13-15)	-	1
		0,4 – 0,6	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2.4-Д і МЦПА, та деякі багаторічні дводольні види	Обприскування з фази 3-х до 7-ми листків культури (включно) (ВВСН 13-17)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Антисапа, ВГ (метрибузин, 700 г/кг) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,0 – 1,4	Томати розсадні	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висаджування розсади	-	1
		0,7 – 1,0	Томати безрозсадні	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культур або у фазі 2 – 4 листків	-	1
		0,4 – 1,0	Соя	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після посіву але до появи сходів культури	-	1
4.	Антисапа Ліквід, КС (метрибузин, 600 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,5 – 1,0	Томати розсадні	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висаджування розсади	-	1
		0,4 – 1,0	Томати безрозсадні	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури або у фазі 2 – 4 листків	-	1
		0,5 – 1,0	Соя	Однорічні дводольні та деякі однорічні злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після посіву але до появи сходів культури	-	1
5.	Панда, КЕ (пендиметалін, 330 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	2,5 – 3,0	Пшениця, ячмінь (озимі, ярі)	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування посівів після появи повних сходів до фази середини кущення (оптимально – 1 – 4 листки культури на початкових стадіях росту бур'янів)	-	1
		3,0 – 6,0	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		2,5 – 4,5	Цибуля (ріпка)	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		3,0 – 6,0	Горох, нут	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
6.	Генезис, РК (імазапір 15 г/л + імазамокс, 33 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	1,0 – 1,2	Соняшник (сорт, стійкі до дії імідазолінонів)	Злакові та дводольні види бур'янів	Обприскування посівів у фазі 4 листків культури на ранніх етапах розвитку бур'янів	-	1
7.	Прадо/Імпір, РК (імазетапір, 100 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,5 – 1,0	Соя	Злакові та однорічні двосім'ядольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, до сходів або після сходів у фазі 2 – 3 справжніх листків культури	-	1
8.	Дікбан/Діксор, РК (дикамба, 480 г/л) ТОВ «Ранголі», Україна; ТОВ «Інпест Юкрейн», Україна	0,15 – 0,3	Пшениця озима та яра, жито, овес, ячмінь	Однорічні та деякі багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів з фази кушіння до виходу в трубку культури як добавка до 2,4-Д або в чистому вигляді	-	1
		0,4 – 0,6	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків у культури як добавка до 2,4-Д або в чистому вигляді	-	1
9.	*Одін, РК (2-метил-4-хлорфеноксиоцтова кислота у формі калійної солі, у кислотному еквіваленті, 500 г/л) ТОВ «Група компаній «Вітагро», Україна	1,0 – 1,5	Пшениця озима	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у період від фази кушіння культури до фази прапорцевого листка	-	1
		1,0 – 1,5	Ячмінь озимий	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у період від фази кушіння культури до фази прапорцевого листка	-	1
		1,0 – 1,5	Ячмінь ярий	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у період від фази кушіння культури до фази прапорцевого листка	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0,75 – 1,25	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
10.	Мезоген, КС (Mezogen, SC) (мезотріон 480г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,2 + ПАР	Кукурудза	Однорічні та окремі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазах від 3 до 8 листків	-	1
11.	Обджектів, КЕ (Objective, EC) (оксифлуорфен, 240 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,8 – 1,0	Соняшник	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту після посіву до появи сходів культури	-	1
		0,2 + 0,3 + 0,5	Цибуля (ріпка) (забороняється реалізація цибулі на «перо»)	Однорічні дводольні бур'яни	перша обробка – у фазу 1 – 2 листків культури, наступні з інтервалом 7 – 10 днів	-	3
12.	Факсиміл, КС (Faxumil, SC) (флорасулам, 50 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,075 – 0,125	Пшениця, ячмінь	Багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від 4 листка культури до стадії другого вузла	-	1
		0,075 – 0,125	Кукурудза	Багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування у фазу 3 – 6 листків культури	-	1
13.	Флуроке, КЕ (Flurox, EC) (флуороксипір, 333 г/л, у формі метилгептилового ефіру, 480 г/л) Шарда Кропхем Лімітед, Індія	0,3 – 0,5	Пшениця, ячмінь	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації, від фази кушення до фази прапорцевого листка включно	-	1
		0,5 – 0,6	Кукурудза	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування під час вегетації, у фазі від 3 до 7 листків культури включно	-	1
14.	Проман 500 SC, КС (метобромурон, 500 г/л) Сертіс Белхим Б.В, Нідерланди	2,0 – 4,0	Картопля, соняшник, соя	Однорічні дводольні бур'яни, злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
15.	Лентагран 600 ЕС, КЕ (піридат, 600 г/л) Сертіс Белхим Б.В, Нідерланди	1,0 – 1,5	Кукурудза, сорго	Однорічні дводольні бур'яни, злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після появи сходів культури	-	1
		1,5 – 2,0	Нут	Однорічні дводольні бур'яни, злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Клок, КЕ (пропізохлор, 720 г/л) Агро Лайф Сайнс Корпорейшн, Індія	2,0 – 3,0	Ріпак ярий, соняшник	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		3,0	Буряки цукрові	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
17.	КРОПЕКС ЕС, КЕ (кломазон, 480 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	0,15 – 0,2	Капуста	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		0,15 – 0,2	Ріпак	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	-	1
		0,15 – 0,2	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	-	1
18.	СТРАТЕГ SC, KC (прометрин, 500 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	3,0 – 4,0	Картопля	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		2,0 – 4,0	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	-	1
		3,0 – 4,0	Соя	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, одночасно з посівом або до появи сходів культури	-	1
19.	Герзамокс, РК (імазамокс, 40 г/л) ТОВ «Адама Україна», Україна; СІНОХЕМ АГРО КО., ЛТД., Китай	0,75 – 1,0	Соя	Широкий спектр бур'янів	Обприскування сої у фазу двох – трьох трійчастих листків культури (злакові бур'яни – у фазі 1 – 3 листки, дводольні – 2 – 4 листки)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,0 – 1,2	Соняшник	Широкий спектр бур'янів	Обприскування соняшнику у фазу 2 – 8 справжніх листків культури	-	1
20.	Бентазон-стар, РК (бентазон, 480 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	3,0	Горох	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 5 – 6 листків культури	-	1
21.	Метамітрон-стар, КС (метамітрон, 700 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	5,0 – 6,0	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби, до сходів або в фазі 1 – 2 справжніх листків культури	-	1
		2,0	Буряки цукрові	Однорічні дводольні бур'яни	Перше обприскування у фазі сім'ядоль бур'янів, наступні – з інтервалом 8 – 10 днів між обробками	-	3
22.	Про-стар 500 КС (прометрин 500 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	4,0	Соняшник	Однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби або до появи сходів культури	-	1
23.	Хізалофоп-стар, КЕ (хізалофоп-п-етил, 125 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	0,8 – 1,2	Ріпак, соя, картопля	Однорічні та багаторічні злакові бур'яни	Обприскування у фазі 2 – 4 листків однорічних, 10 – 15 см багаторічних бур'янів	-	1
24.	Гліфкаліт, РК (калійна сіль гліфосату, 676 г/л, у кислотному еквіваленті, 550 г/л) ТОВ «ВКФ «Укр Нано Хім», Україна	1,3 – 3,6	Поля, призначені під посіви сільсько-господарських культур	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні за 2 тижні до висівання	-	1
		1,3 – 3,6	Ділянки під посадку хвойних та листяних порід дерев	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів восени після збирання попередника або навесні за 2 тижні до висівання	-	1
		1,3 – 3,5	Сади і виноградники	Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Направлене обприскування бур'янів в міжряддях культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Лендмайстер, СЕ (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5) ТОВ «ВКФ «Укр Нано Хім», Україна	4,0 – 4,5	Соняшник	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посіву, під час висівання, після висівання але до появи сходів культури	-	1
26.	Мушкет Універсал 460 OD, МД (йодсульфурон-метил натрію, 5 г/л + 2,4-Д 2-етилгексильовий ефір, 430 г/л + мефенпір-диетил, 25 г/л) Байєр АГ, Німеччина	0,5 – 0,9	Пшениця озима, ячмінь озимий, ячмінь ярий	Дводольні бур'яни	Обприскування посівів навесні від початку кущіння до першого вузла культури	-	1
27.	Лігерон, КЕ (S-метолахлор, 960 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	1,0 – 1,6	Кукурудза, соняшник, соя, буряки цукрові	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1
		1,6	Горох, ріпак, кавуни	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання або до появи сходів культури (у зонах недостатнього зволоження – із загортанням)	-	1
		1,6 – 2,0	Сорго	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування у фазу 3 – 5 листків культури	-	1
		1,6	Картопля	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до посадки, але до появи сходів культури	-	1
28.	Нованте, КС (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «Дефенда», Україна	3,8 – 4,5	Кукурудза, сорго	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до сівби, під час сівби, після сівби, або по сходах у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
		3,5 – 4,5	Соняшник, соя, картопля	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Кентавр, ВГ (римсульфурон, 500 г/кг + тифенсульфурон-метил, 250 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	20 – 25 г/га + 0,2 – 0,3 л/га ПАР «Мачо»	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування культури у фазі 2 – 5 листіків	-	1
30.	Рим, ВГ (римсульфурон, 250 г/кг) ТОВ «Дефенда», Україна	40 – 50 г/га + 0,2 – 0,3 л/га ПАР «Мачо»	Кукурудза	Однорічні та деякі багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування культури у фазі 1 – 7 листків	-	1
31.	Нопасаран® Флекс, РК (імазамокс, 17,5 г/л + амінопіралід, 4,0 г/л + квінмерак, 75,0 г/л) БАСФ Агрокемікал Продактс Б.В., Пуерто Ріко	1,2 – 1,8	Ріпак озимий (сорт, стійкі до дії імідазолінонів)	Багаторічні та однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування восени у фазу 2 – 8 листків культури, або навесні: від початку росту стебла до початку бутонізації культури	-	1
		1,2 – 1,8	Ріпак ярий (сорт, стійкі до дії імідазолінонів)	Багаторічні та однорічні дводольні та злакові бур'яни	Обприскування від фази 2 листків культури до початку бутонізації	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	РІДОВЕР Екстра (RID OVER Xtra), РГ (гліфосат, 800 г/кг (еквівалент 888 г/кг амонійної солі) Шаньдун Вейфан Рейнбоу Кемікал Ко., Лтд. (Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd), КНР	1,0 – 2,5	Поля, призначені під посів сільсько-господарських культур	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів весною за 14 днів до сівби сільськогосподарських культур або восени, після збирання попередника	-	1
33.	Гліфокен, РГ (Glyfoken, SG) (гліфосат, 800 г/кг (еквівалент 888 г/кг амонійної солі) Перлком Лімітед (Pearlcom Limited), Республіка Кіпр	1,0 – 2,5	Поля, призначені під посів сільсько-господарських культур	Однорічні та багаторічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування вегетуючих бур'янів весною за 14 днів до сівби сільськогосподарських культур або восени, після збирання попередника	-	1
34.	Топразор, РК (Toprazor, SL) (дикамба, 160 г/л + топрамезон, 50 г/л) Іфаґрі Лтд (Ifagri Ltd), Великобританія	1,0 – 1,5	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні (в т.ч. стійкі до 2,4-Д) та злакові бур'яни	Обприскування у ранні стадії розвитку бур'янів, у стадії розвитку культури 3 – 8 листків	-	1
35.	Оверсайз, МД (Oversize, OD) (мезотріон, 70 г/л+ нікосульфурон, 40 г/л + тербутилазин, 200 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	1,2 – 1,5	Кукурудза	Однорічні, багаторічні однодольні та дводольні бур'яни	Обприскування культури у фазі 3 – 5 листків та ранніх фазах росту бур'янів (стадія бур'янів: 2 – 4 листки – норма 1,2 л/га, 6 – 8 листки – норма 1,5 л/га)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	Цукрон+, РК (клопіралід, 300 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,3 – 0,5	Буряки цукрові	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 1 – 3 справжніх листіків культури	-	1
		0,2 – 0,5	Ріпак	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 4 листків культури по вегетуючих бур'янах	-	1
		0,3 – 0,5	Кукурудза	Однорічні дводольні, у т.ч. стійкі до 2,4-Д, та багаторічні коренепаросткові бур'яни	Обприскування до сходів та у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
37.	Оптимум, РК (дикамби амінна сіль, 480 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,8	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
		0,15 – 0,3	Пшениця яра і озима	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку культури	-	1
		0,15 – 0,3	Ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку культури	-	1
38.	Мікодин, РК (2,4-Д диметиламінна сіль, 344 г/л + дикамби диметиламінна сіль, 120 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	0,8	Пшениця	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку культури	-	1
		0,5 – 0,7	Ячмінь ярий	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку культури	-	1
		1,0 – 1,25	Кукурудза	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	Зеагран 350, СЕ (тербутилазин, 250 г/л + бромексиніл октаноат і гептаноат, 100 г/л) Нуфарм ГмбХ енд Ко КГ, Австрія; ТОВ «Нуфарм Україна», Україна	1,6 – 2,0	Кукурудза	Однорічні злакові та дводольні бур'яни	Обприскування посівів культури у фазі 4 – 10 листків культури	-	1
40.	Етафорон, ВГ (етаметсульфурон-метил, 750 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	20 – 25 г/га	Соняшник	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування в фазі 2 – 4 пари справжніх листоків культури та в ранні фази росту бур'янів (від сім'ядолі до 2-х листків)	-	1
		20 – 25 г/га	Ріпак озимий та ярий	Однорічні та деякі багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів восени або весною у фазі від сім'ядолі до 8 листків у ріпаку та ранні фази росту бур'янів (від сім'ядолі до 2-х листків)	-	1
41.	Грантокс, РК (2-метил-4-хлор- феноксистова кислота у формі солей диметиламіну натрію та калію, 500 г/л) ТОВ «Агрофлекс», Україна	1,0 – 1,5	Пшениця озима та яра	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази кушіння культури до виходу в трубку	-	1
		1,0 – 1,5	Ячмінь, овес, жито	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази кушіння культури до виходу в трубку	-	1
		0,7 – 1,7	Просо	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів від фази кушіння культури до виходу в трубку	-	1
		0,7 – 1,7	Сорго	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 6 листків культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,5 – 2,0	Рис	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі повного кушіння культури проти бульбоочерета, частухи та ін.	-	1
		0,5	Горох	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі 3 – 5 листків культури	-	1
		0,7 – 1,2	Льон-довгунець	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі ялинки при висоті культури 3 – 10 см	-	1
		0,9 – 1,7	Картопля	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів до сходів культури	-	1
		0,5 – 0,75	Люцерна	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазу 1 – 2 трійчастого листка культури	-	1
		0,8 – 1,4	Конюшина повзуча та польова	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у рік посіву, після появи першого трійчастого листка (закінчувати обробку за місяць до кінця вегетації)	-	1
		0,8 – 1,4	Конюшина польова (насінники)	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у рік збору врожаю насіння, протягом 2 – 3 тижнів від початку проростання до ембріональної закладки суцвіть у конюшини (солому на корм худобі використовувати не раніше, ніж через 45 діб після обробки)	-	1
		0,8 – 1,4	Конюшина польова під покривом ячменю	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів після появи 1 – 2 трійчастих листків у конюшини (фаза кушіння ячменю)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1,1 – 2,3	Тимофіївка лучна	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у фазі куштиння культури	-	1
		1,1 – 2,3	Стоколос безостий, лисохвіст лучний	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у рік посіву культури, починаючи з фази 1 – 3 листків до виходу в трубку	-	1
		2,3 – 2,8	Райграс високий, вівсяниця лучна	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування посівів у рік посіву культури, починаючи з фази 1 – 3 листків до виходу в трубку	-	1
		1,4 – 4,0	Сінокісні угіддя та пасовища	Однорічні та багаторічні дводольні бур'яни	Обприскування шкідливих та отруйних вегетуючих бур'янів та небажаної флори (випас худоби та скошування трав дозволяється не раніше, ніж через 40 діб після обробки)	-	1
42.	Румер 240, КЕ (оксифлуорфен, 240 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	0,5 – 1,0	Цибуля (крім цибулі на «перо»)	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування у фазу 2 – 3 листків культури	-	1
		0,2 + 0,3 + 0,5	Цибуля (крім цибулі на «перо»)	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування 0,2 л/га – у фазу 1 – 2 листки культури при появі сім'ядолів бур'янів; 0,3 л/га – через 7 – 10 днів; 0,5 л/га – через 7 – 10 днів	-	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
43.	Пандора 500, КС (S-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	4,0 – 4,5	Кукурудза	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання або в фазі 3 – 5 справжніх листків культури	-	1
		4,0 – 4,5	Соняшник	Однорічні злакові та деякі дводольні бур'яни	Обприскування ґрунту до висівання, під час висівання, після висівання але до появи сходів культури	-	1
44.	Лаурен 600, КС (аклоніфен, 600 г/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	3,0 – 6,0	Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	Обприскування ґрунту після сівби до появи сходів культури	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дикват-стар, РК (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1
2.	Гліфкаліт, РК (калійна сіль гліфосату, 676 г/л, у кислотному еквіваленті, 550 г/л) ТОВ «ВКФ «Укр Нано Хім», Україна	2,0 – 3,9	Зернові колосові культури	Обприскування посівів за 2 тижні до збирання, за вологості зерна не більше 30%	14	1
		1,7 – 1,9	Соя	Обприскування посівів у фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів (за вологості насіння не більше 35 – 40%)	11	1
		1,7 – 1,9	Соняшник	Обприскування посівів у фазі побуріння кошиків	14	1
3.	СА Джеб (SA Jab), РК (дикват дибромід, 200 г/л) ТОВ «Спектр-Агро», Україна	2,0 – 3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1
		2,0 – 3,0	Ріпак озимий, ріпак ярий	Обприскування посівів при побурінні 70% стручків	7	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для застосування авіаційним методом

Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ДРАГУН ЕС, КЕ (хлорпірифос, 480 г/л) ТОВ «Грін Експрес», Україна; ТОВ «Клов», Україна	1,2	Кукурудза	Стебловий кукурудзяний метелик, бавовникова совка	Обприскування в період вегетації	30	1

Десиканти

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дикват-стар, РК (дикват дибромід, 150 г/л) ТОВ «Агростар Кемікал», Україна	3,0	Соняшник	Обприскування посівів у фазі початку побуріння кошиків	6	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Препарати для роздрібного продажу населенню
Інсектициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Наповал, КС (імідаклоприд, 300 г/л + альфа-циперметрин, 100 г/л) ТОВ «Альфа Сمارт Агро», Україна	1,0 – 1,5 мл / 4 – 5 л води / 100 м ²	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	20	2
2.	Таурус, ЗП (піридабен, 200 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	5 – 9 г / 10 л води / 100 м ²	Яблуна	Кліщі	Обприскування в період вегетації	20	1
3.	Тирана, КС (імідаклоприд, 280 г/л + тіабендазол, 80 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	5 – 7 мл / 10 кг бульб	Картопля	Дротяники, несправжні дротяники, личинки пластинчастовусих, колорадський жук, попелиці. Ризоктоніоз, парша звичайна	Обробка бульб перед висаджуванням	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Фунгіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	КАЗУМІН 8Л, РК (продукт ферментації <i>Streptomyces kasugaensis</i> , 80 г/л) Хокко Кемікал Індастріз Ко., Лтд., Японія	4 – 7 мл / 5 л води / 100 м²	Томати	Бактеріальні хвороби: бактеріальна плямистість, чорна бактеріальна плямистість, мокра гниль плодів та ін.	Обприскування в період вегетації	-	3
		4 – 7 мл / 5 л води / 100 м²	Капуста	Бактеріальні хвороби: слизистий бактеріоз, судинний бактеріоз, бактеріальна плямистість та ін.	Обприскування в період вегетації	-	3
		8 – 10 мл / 8 – 10 л води / 100 м²	Яблуна, груша	Бактеріальний опік, парша	Обприскування в період вегетації	-	3
2.	Ацидан, ЗП (металаксил, 80 г/кг + манкоцеб, 640 г/кг) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	20 г / 5 л води / 100 м²	Картопля	Фітофтороз, суха плямистість	Обприскування у період вегетації	20	3
		20 г / 5 л води / 100 м²	Томати	Фітофтороз, суха плямистість	Обприскування у період вегетації	14	3
3.	Фрідом, КС (диметоморф, 200 г/л + флуазинам, 200 г/л) ТОВ «Сімейний Сад», Україна	10 мл / 5 – 7 л води / 100 м²	Картопля	Фітофтороз	Обприскування в період вегетації культури.	20	2
		10 мл / 10 л води / 100 м²	Виноградники	Мілдью	Обприскування в період вегетації культури.	30	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Айрон, ЗП (сульфат заліза (FeSO_4) – 53%) ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна	300 – 600 г/ 10 л води; до 1 л робочого розчину / дерево	Яблуня	Парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моніліоз, мохи, лишайники	Обприскування в період вегетації (обприскування дерев з верхньої частини крони, переходячи на нижню, не частіше, ніж через 15 діб при наявності мохів та лишайників, а також при появі перших ознак захворювань)	60	2
		300 – 600 г/ 10 л води; до 0,2 л робочого розчину / кущ	Смородина	Борошниста роса, септоріоз, бокальчаста іржа, антракноз, мохи, лишайники	Обприскування в період вегетації (суцільне обприскування кущів, не частіше, ніж через 15 діб при наявності мохів та лишайників, а також при появі перших ознак захворювань)	60	2
		300 – 400 г/ 10 л води; до 0,2 л робочого розчину / м ²	Виноград	Мільдю, борошниста роса, антракноз, бактеріальний рак, чорна плямистість, сіра гниль	Обприскування в період вегетації (обприскування з верхньої частини крони, переходячи на нижню при появі перших ознак захворювань)	60	2
5.	БОРДО МК, ВП (сульфат міді (CuSO_4) – 85 – 98%) ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна	1 – 2% розчин (100 – 200 г/л води; до 1 – 2 л робочого розчину / дерево)	Яблуня	Парша, іржа, борошниста роса, септоріоз, моніліоз	Обприскування навесні, до розпускання бруньок, або восени, після опадання листя 1 – 2% водним розчином	14	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7	8
		1 – 2% розчин (100 – 200 г/л води; до 1 – 2 л робочого розчину / дерево)	Абрикос	Клястероспоріоз, кокомікоз, моніліоз, борошниста роса, бактеріальний рак	Обприскування навесні, до розпускання бруньок, або восени, після опадання листя 1 – 2% водним розчином	14	2
		0,1% розчин (10 г/10 л води; 0,05 – 0,1 л робочого розчину/м²)	Томати	Борошниста роса, септоріоз	Обприскування в період бутонізації 0,1% водним розчином	14	2

Гербіциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/ га, м², т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Антисапа, ВГ (метрибузин, 700 г/кг) ТОВ «Укрвіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	5 – 15 г / 4 – 5 л води / 100 м²	Картопля	Однорічні дводольні та деякі злакові види бур'янів	Обприскування ґрунту до появи сходів або за висоти культури не більше 10 см	-	1
2.	Антисапа Ліквід, КС (метрибузин, 600 г/л) ТОВ «Укрвіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	5 – 15 мл / 4 – 5 л води / 100 м²	Картопля	Однорічні дводольні та деякі злакові види бур'янів	Обприскування ґрунту до появи сходів або за висоти культури не більше 10 см	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Добрива

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (кг/га, л/га, кг/т, л/т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Кайші Макс, МГ (L-вільні амінокислоти – 80% w/w, N _{заг.} – 13% w/w) Хешенбіхлер ГмбХ, Австрія	0,3 – 0,5 кг/га	Картопля, томати	Обприскування в період вегетації (стимулювання росту та розвитку рослини, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічних процесів, підвищення врожайності)	4
		0,3 – 0,6 кг/га	Яблуня, виноградники		4
2.	Фітомаре, р. (N – 5,5%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3,5%, B – 0,35%, Mo – 0,2%, органічна речовина – 8%, вільні амінокислоти – 2%, екстракт водоростей – 15%) АТЛАНТИКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	2,0 – 3,0 л/га (0,2 – 0,3 л / 100 л води)	Плодові культури (яблуня, персик)	Позакореневе підживлення	3
		2,0 – 3,0 л/га (0,5 – 0,75 л / 100 л води)	Овочеві культури (томати, перець)	Позакореневе підживлення	1
3.	BRANDT InVigo (БРЕНДТ ІнВіго), р. (N – 2,5%, N _{орг.} – 1,5%, Fe – 2%, Mn – 0,5%, Zn – 0,5%, вільні амінокислоти (Proline) – 0 – 6%, AATC (n-acetyl-thiazoline-4-carboxylic acid) – 5%) BRANDT EUROPE S.L., Іспанія	0,15 – 0,25 л/га	Зернові (пшениця озима, кукурудза), зернобобові (соє), олійні (соняшник), технічні (буряки цукрові) культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		0,07 – 0,1 л/ 100 л води	Овочеві культури (томати)	Позакореневе підживлення	1 – 3
		1,0 – 2,0 л/га	Овочеві культури (томати)	Кореневе підживлення	1 – 3
		0,07 – 0,1 л/ 100 л води	Плодові (яблуня), ягідні (суніця) культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		1,0 – 2,0 л/га	Плодові (яблуня), ягідні (суніця) культури	Кореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
4.	«Комплекс Турбо Лайф», РК (марки: «Універсальний Турбо», «Буряковий Турбо», «Насіння Турбо», «Овочевий Турбо») (N – 14 – 150 г/л; P ₂ O ₅ – 65 – 115 г/л; K ₂ O – 45 – 105 г/л; MgO – 0,2 – 0,6 г/л; SO ₃ – 0,9 – 42 г/л; B – 0,4 – 2,8 г/л; Cu – 0,2 – 17,6 г/л; Fe – 0,6 – 2,5 г/л; Mn – 0,2 – 13,8 г/л; Mo – 0 – 1,5 г/л; Zn – 0,1 – 13,5 г/л; Co – 0 – 0,13 г/л; амінокислоти – 0 – 50 г/л; фітогормони – 0 – 0,05 г/л) ПП «НВО «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна	Марка «Універсальний Турбо»			
		1,0 – 1,5 л/га	Кукурудза, сояшник, ріпак	Обприскування в період вегетації	3
		Марка «Буряковий Турбо»			
		1,0 – 1,5 л/га	Буряки цукрові, буряк столовий	Обприскування в період вегетації	3
		Марка «Насіння Турбо»			
		1,0 л/т	Зернові колосові культури	Обробка насіння	1
5.	«Лайф Перфект», РК (марки: «Бор Молібден», «Молібден Кобальт», «Цинк 120», «Кальцій 200») (N – 70 – 200 г/л; B – 0 – 150 г/л; Mo – 0 – 60 г/л; Co – 0 – 6,25 г/л; S – 0 – 125 г/л; Zn – 0 – 120 г/л; CaO – 0 – 200 г/л; MgO – 0 – 10 г/л) ПП «НВО «АГРОБІОІНОВАТІКА», Україна	Марка «Бор Молібден»			
		1,0 – 1,5 л/га	Буряки цукрові, сояшник, ріпак	Обприскування в період вегетації	2
		Марка «Молібден Кобальт»			
		1,0 – 1,5 л/га	Соя, горох	Обприскування в період вегетації	2
		Марка «Цинк 120»			
		1,0 – 1,5 л/га	Зернові колосові культури, кукурудза	Обприскування в період вегетації	2
6.	«ІНТЕРМАГ НУТРІБУСТ», р. (марки: Зернові, Кукурудза, Соя, Олійні, Цукровий буряк, Картопля, Овочеві) (N – 5%; SO ₃ – 3,5 – 6,5%; Na ₂ O – 0 – 2,4%; B – 0,04 – 0,71%; Co – 0 – 0,07%; Cu – 0,2 – 0,7%; Fe – 0,33 – 1,7%; Mn – 0,85 – 1,7%; Zn – 1,0 – 2,65%; Mo – 0,007 – 0,021%; MgO – 2%) ТОВ «Інтермаг», Польща	Марка Зернові			
		1,0 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		Марка Кукурудза			
		1,0 л/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		Марка Соя			
		1,0 л/га	Зернобобові культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		Марка Олійні			
		1,0 л/га	Олійні культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		<i>Марка Цукровий буряк</i>			
		1,0 л/га	Буряки цукрові	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Картопля</i>			
		1,0 л/га	Картопля	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Овочеві</i>			
		1,0 л/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
7.	«ІНТЕРМАГ МАКРО», кр.п. (марки: ОПТИ, НІТРО, ФОСФО, КАЛІ) (N – 11 – 20%; P ₂ O ₅ – 12 – 53%; K ₂ O – 5 – 38%; B – 0,03%; Cu – 0,03%; Fe – 0,15%; Mn – 0,07%; Zn – 0,07%; Mo – 0 – 0,002%) ТОВ «Інтермаг», Польща	<i>Марка ОПТИ</i>			
		2,0 – 5,0 кг/га	Пшениця яра (зернові колосові), ріпак ярий, соняшник (олійні)	Позакореневе підживлення	1 – 4
		<i>Марка НІТРО</i>			
		2,0 – 5,0 кг/га	Пшениця яра	Позакореневе підживлення	1 – 4
		<i>Марка ФОСФО</i>			
		2,0 – 5,0 кг/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення	1 – 4
8.	Інтермаг, кр.п. (марки: Дропферт 18-18-18; Дропферт 4-40-13; Дропферт 9-10-36; Дропферт 14,5-7,5-18,5 (Лохина)) (N – 4 – 18%; P ₂ O ₅ – 7,5 – 40%; K ₂ O – 13 – 36%; MgO – 0 – 6%; SO ₃ – 0 – 21%; B – 0 – 0,02%; Cu – 0,01%; Fe – 0,12%; Mn – 0,06%; Mo – 0 – 0,003%; Zn – 0,025%) ТОВ «Інтермаг», Польща	<i>Марка КАЛІ</i>			
		2,0 – 5,0 кг/га	Буряки цукрові	Позакореневе підживлення	1 – 4
		0,2 – 4,0 кг/га	Зернові культури, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
		3,0 – 5,0 кг/га	Зернобобові, кукурудза	Позакореневе підживлення	2 – 4
		2,0 – 5,0 кг/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		3,0 – 4,0 кг/га	Овочеві культури, ягідники	Позакореневе підживлення	2 – 4
		0,2 – 0,5 кг/га	Овочеві, картопля, ягідники, плодови	Фертигація 0,05 – 0,15% водним розчином	2 – 4
9.	Інтермаг, р. (марки: Бор, Гровон, Кальцій Турбо, Молібден, Плодово-Ягідні, Прімсід Мульти, Титаніт) (N – 0 – 8,5%; P ₂ O ₅ – 0 – 35,0%; K ₂ O – 0 – 3,0%; S – 0 – 4,0%; Na ₂ O – 0 – 1,0%; B – 0 – 11,0%; Cu – 0 – 0,3%; Zn – 0 – 0,5%; Fe – 0 – 0,8%; Mn – 0 – 0,3%; Mo – 0 – 3,0%; MgO – 0 – 5,0%; Ti – 0 – 0,7%) ТОВ «Інтермаг», Польща	0,5 – 1,0% водний розчин	Декоративні культури	Фертигація	2 – 4
		0,2 – 0,3 л/100 кг	Зернові, бобові, технічні, овочеві, культури	Обробка насіння	1
		0,2 – 8,0 л/га	Зернові (в т.ч. пшениця ячмінь, кукурудза), технічні (в т.ч. соняшник, ріпак, буряки цукрові), бобові (горох, соя), картопля, садові(в т.ч. яблуна, вишні), ягідники (в т.ч. малина,	Фертигація протягом вегетації, закритий ґрунт – одночасно з поливом 0,05 – 2,5% водним розчином добрива	3 – 7



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
			порічки, полуниця), овочеві культури відкритого та закритого ґрунту (в т.ч. цибуля, капуста, морква), декоративні рослини та газонні трави		
10.	«ЕТАЛОН» (марка «Еталон Зернові»), р. (N – 6 г/л, P ₂ O ₅ – 16 г/л, K ₂ O – 6 г/л, B – 0,65 г/л, Co – 0,01 г/л, Cu – 1,2 г/л, Zn – 0,9 г/л, Mn – 1,1 г/л, Mo – 0,025 г/л, гумат амонію – 10 г/л, амонійна сіль янтарної кислоти – 1 г/л) ТОВ «Агрокомпанія «Еталон», Україна	1,0 л/т	Зернові культури	Обробка насіння	1
		0,5 – 0,7 л/га	Зернові культури	Позакореневе підживлення (перше підживлення – від початку виходу рослин у трубку, друге – у фазу колосіння)	2
11.	ОРАКУЛ, р. (марки: Мультикомплекс, Сірка Актив, В, Zn, P) (N – 2,3 – 15%; P ₂ O ₅ – 0 – 24%; K ₂ O – 0 – 3,5%; Na ₂ O – 0 – 4%; S – 0 – 15%; B – 0 – 11,2%; Co – 0 – 0,005%; Cu – 0 – 0,65%; Zn – 0 – 9%; Mo – 0 – 0,01%; Mn – 0 – 0,5%; Fe – 0 – 0,5%; ЕДТА – етилендіамінооцтова кислота, ОЕДФ – оксietiлендіфосфоновіа кислота, суміш природних амінокислот, аліфатичні кислоти, коламін (моноетаноламін)) МП НДП «Долина», Україна	<i>Марка Мультикомплекс</i>			
		1 – 2 л/га	Зернові, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка Сірка Актив</i>			
		1 – 3 л/га	Ріпак ярий	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка В</i>			
		1 – 2 л/га	Соняшник	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка Zn</i>			
		1 – 2 л/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка P</i>			
		1 – 4 л/га	Пшениця озима	Позакореневе підживлення	1 – 3
12.	Гумекс Ультра, р. (гумінові та фульвові кислоти – 25 – 35%) МП НДП «Долина», Україна	0,02 – 0,5 л/т	Зернові, олійні, технічні, овочеві культури (пшениця	Обробка насіння	1
		0,05 – 0,5 л/га	яра, соняшник, буряки цукрові, томати)	Позакореневе підживлення	1 – 6
13.	CrossAktiv (КросАктив), р. (марки: 6:22:5 + Zn, 5:20:5, 3:18:18) (N – 3 – 6%; P ₂ O ₅ – 18 – 22%; K ₂ O – 5 – 18%; Zn – 0,5%) ТОВ «АГРОТОК ЛТД», Україна	<i>Марка 3:18:18</i>			
		15,0 – 50,0 л/га	Зернові колосові культури	Внесення в ґрунт при посіві	1
		<i>Марка 6:22:5 + Zn</i>			
		15,0 – 50,0 л/га	Кукурудза	Внесення в ґрунт при посіві	1
		<i>Марка 5:20:5</i>			
		15,0 – 50,0 л/га	Соняшник	Внесення в ґрунт при посіві	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
14.	Poly-Feed GG/Drip, кр. (марки: 6-15-38+3+ME, 12-5-40+ME, 16-8-32+ME, 18-18-18+2+ME, Foliar 21-21-21+ME) (N – 6,0 – 21,0%; P ₂ O ₅ – 5,0 – 21,0%; K ₂ O – 18,0 – 40,0%; MgO – 0 – 3,0%; Fe – 0,05 – 0,106%; Zn – 0,0075 – 0,015%; Cu – 0,0055 – 0,011%; Mo – 0 – 0,007%; Mn – 0,02 – 0,05%; B – 0,01 – 0,02%) Хайфа Негев Технолоджіс ЛТД (Haifa Negev Technologies Ltd), Ізраїль	5,0 – 6,0 кг/га	Пшениця	Позакореневе підживлення (перше – через 21 день після сходів, інтервал – 14 днів)	2 – 3
		13,0 – 18,0; 15,0 – 18,0 кг/га/добу	Огірки	Фертигація (13,0 – 18,0 кг/га/добу – раннє цвітіння, 15,0 – 18,0 кг/га/добу – зав'язування та досягання плодів)	2 – 3
		13,0 – 18,0; 15,0 – 18,0 кг/га/добу	Томати	Фертигація (13,0 – 18,0 кг/га/добу – раннє цвітіння, 15,0 – 18,0 кг/га/добу – зав'язування та досягання плодів)	2 – 3
15.	Poly-Feed GG/Drip, кр. (марки: 11-44-11+HME, 13-40-13+HME, 20-20-20+ME, 23-7-23+ME, Haifa-MKP SG) (N – 0 – 23,0%; P ₂ O ₅ – 7,0 – 52,0%; K ₂ O – 11,0 – 34,2%; Fe – 0 – 0,1%; Zn – 0 – 0,015%; Cu – 0 – 0,011%; Mo – 0 – 0,007%; Mn – 0 – 0,05%; B – 0 – 0,02%) Хайфа Негев Технолоджіс ЛТД (Haifa Negev Technologies Ltd), Ізраїль	<i>Марки: 11-44-11+HME, 13-40-13+HME, 20-20-20+ME, 23-7-23+ME</i>			
		5,0 – 6,0 кг/га	Пшениця	Позакореневе підживлення (перше – через 10 – 15 днів після сходів, інтервал – 14 днів)	2 – 3
		5,0 – 6,0 кг/га/добу	Огірки	Фертигація (з моменту висаджування до початку цвітіння)	1 – 3
		6,0 – 8,0 кг/га/добу	Томати	Фертигація (з моменту висаджування до початку цвітіння)	1 – 3
		<i>Марка Haifa-MKP SG</i>			
		10,0 – 12,0 кг/га	Пшениця	Фертигація (перша – через 10 – 15 днів після сходів, друга – через 3 тижні)	2
		5,0 – 50,0 кг/га/добу	Огірки	Фертигація (5 кг/га/добу після появи сходів, до 50 кг/га/добу у фазу бутонізації)	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		10,0 – 15,0; 25,0 – 30,0; 15,0 – 20,0 кг/га/добу	Томати	Фертигація (10 – 15 кг/га/добу після пересадки, наступні – 25 – 30 кг/га/добу (плодоутворення), 15 – 20 кг/га/добу (налив плодів))	2 – 3
16.	«ГРОУЛАЙН», р. (марки: Актив, Амінопро, Алгімакс, Максітріо, Аміномакс) (N – 0,5 – 10%, K ₂ O – 1,3 – 7,0%, C _{орг.} – 4,5 – 28%, амінокислоти – 0 – 60%, гумінові речовини – 0 – 24%, екстракт морських водоростей – 0 – 30%) ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна	0,5 – 2,0 л/га	Кукурудза, пшениця, ріпак, соя, буряки цукрові, соняшник	Кореневе та позакореневе підживлення	1 – 3
17.	«Aminoenergy», р. (марки: Aminoenergy 60, Aminoenergy 50, Aminoenergy 50 MAX, Aminopulse 40 MAX, Aminoenergy 40) (N – 6,6 – 12,4%; C _{орг.} – 20 – 33%; Ca – 0,01 – 0,4%; Na – 0,4 – 5%; хлориди – 1 – 5%; сульфати – 0,4 – 1,2%; амінокислоти – 39,4 – 68,1%; вільні амінокислоти – 8 – 23%) ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна	0,5 – 2,0 л/га	Кукурудза	Позакореневе (фоліарне) підживлення	1 – 3
18.	Плагрон (Plagron), р. (марки: Green Sensation, Hydro A, Hydro B, Power Buds, Power Roots) (N – 0,3 – 3,2%; P ₂ O ₅ – 0 – 8,3%; K ₂ O – 1,3 – 9,1%; SO ₃ – 0 – 2,8%; MgO – 0 – 1,4%; CaO – 0 – 5,9%; B – 0 – 0,007%; Zn – 0 – 0,01%; Fe – 0 – 0,9%; Cu – 0 – 0,004%; Mn – 0 – 0,034%; Mo – 0 – 0,0007%) ФОП Прокоф'єва К.А., Україна	0,3 – 2,0 л/га	Троянди	Позакореневе підживлення	4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
19.	Gromenta, р. (марки: BorMax, Nexora, ProAmin, Zn100, SulfoMax) (N – 1,5 – 10%; P ₂ O ₅ – 0,5 – 40%; K ₂ O – 0,5 – 25%; SO ₃ – 0 – 5,5%; Fe – 0 – 0,06%; Mn – 0 – 2,5%; B – 0 – 14%; Zn – 0 – 10%; Cu – 0 – 1,5%; Mo – 0 – 0,012%; Co – 0 – 0,006%, амінокислоти – 0 – 50%) ТОВ «АГРО-ВІННЕР», Україна	0,3 – 2,0 л/га	Пшениця озима, кукурудза, соняшник	Позакореневе підживлення	1 – 3
		1,0 – 5,0 л/га	Кукурудза	Фертигація	1 – 3
20.	НоваТек (NovaTec), гр. (марки: NovaTec Classic 12-8-16 (+3MgO+TE), NovaTec N-Max 24-5-5 (+2MgO+TE), NovaTec Premium 15-3-20 (+2MgO+TE), Easygreen Mini 21 21-5-10 (+3+TE), Easygreen Mini 12 12-12-17(+2+TE)) (N – 12,0 – 24,0%; P ₂ O ₅ – 3,0 – 12,0%; K ₂ O – 5,0 – 20,0%; S – 4,4 – 9,2%; SO ₃ – 0 – 23,0%; B – 0,02%; Zn – 0,01 – 0,02%; Fe – 0,06 – 0,3%, DMPSA – 0 – 0,6%) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	250 – 350 кг/га	Газонна трава, декоративні культури	Розсіювання або розкидання в період вегетації	3 – 6
21.	Басфоліар СП (Basfoliar SP), п. (марки: Basfoliar 7-12-40 SP; Basfoliar 13-40-13 SP; Basfoliar 20-19-19 SP; NovaTec Solub Complete 18-18- 18; NovaTec Solub K-Max 10-5-30) (N – 7,0 – 20,0%; P ₂ O ₅ – 5,0 – 40,0%; K ₂ O – 10,0 – 40,0%; SO ₃ – 0 – 30,0%; MgO – 0 – 2,0%; B – 0,01%; Zn – 0,02 – 0,04%; Fe – 0,05 – 0,1%; Cu – 0,02 – 0,04%; Mn – 0,05 – 0,1%; Mo – 0,001 – 0,003%; DMPSA – 0 – 0,6%) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	2,0 – 4,0 кг/га	Пшениця, кукурудза, соняшник, соя, буряки цукрові	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
22.	Басфоліар (Basfoliar), р. (марки: Basfoliar Fruits SL, Basfoliar Mature SL, Basfoliar Si SL, Basfoliar Aktiv SL, Vitanica RZ) (N – 0 – 5,0%; P ₂ O ₅ – 0 – 40,0%; K ₂ O – 0,6 – 18,0%; MgO – 0 – 5,0%; B – 0 – 0,43%; Zn – 0 – 0,01%; Fe – 0 – 0,05%; Cu – 0 – 0,02%; Mn – 0 – 0,01%; Mo – 0 – 0,85%; SiO ₂ – 0 – 2,0%; Si – 0 – 0,93%; екстракт морських водоростей Ecklonia maxima – 0 – 30%; гліцин-бетаїн – 0 – 13,4%; пролін – 0 – 1,6%; <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> R6CDX®, титр – 1,2*10 ⁹ КУО/г) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	1,0 – 3,0 л/га	Яблуна, персик, черешня, помідор, картопля	Позакореневе підживлення	3 – 5
		2,0 – 10,0 л/га	Яблуна, персик, черешня, помідор, картопля	Краплинне зрошення	3 – 5
23.	Басфоліар (Basfoliar), р. (марки: Basfoliar Avant Natur SL, Basfoliar Cereals SL, Basfoliar Excellent Flo, Basfoliar Kelp SL, Basfoliar Zn Flo) (N – 0 – 16,0%; P ₂ O ₅ – 0 – 1,3%; CaO – 0 – 12,3%; SO ₃ – 0 – 9,5%; MgO – 0 – 4,0%; B – 0 – 6,0%; Zn – 0 – 42,1%; Mn – 0 – 3,5%; екстракт морських водоростей Ecklonia maxima – 0 – 100%; гліцин-бетаїн – 0 – 5%; вільні амінокислоти рослинного походження – 0 – 10,5%, ауксини-еквівалент – 11 мг/л; цитокініни-еквівалент – 0,03 мг/л) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	2,0 л/т	Кукурудза, соняшник, соя, пшениця	Обробка насіння	1
		0,3 – 3,0 л/га	Кукурудза, соняшник, соя, пшениця, яблуна	Позакореневе підживлення	3 – 5
24.	Гранульована вапняно-аміачна селітра (granulated calcium ammonium nitrate), гр. (N – 27,0%, CaO – 7,0%, MgO – 5,0%) НІТРОГЕНМУВЕК ЗРТ (NITROGENMUVEK ZRT), Угорщина	250 – 500 кг/га	Зернові культури	Основне внесення та підживлення під час вегетації, розкидання гранул та перемішування їх з ґрунтом	3 (з періодом 1 раз на місяць)
25.	Прильована вапняно-аміачна селітра (prilled calcium ammonium nitrate), гр. (N – 27,0%, CaO – 7,0%, MgO – 5,0%) НІТРОГЕНМУВЕК ЗРТ (NITROGENMUVEK ZRT), Угорщина	250 – 500 кг/га	Зернові культури	Основне внесення та підживлення під час вегетації	3 (з періодом 1 раз на місяць)



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
26.	КАРБАМІД (сечовина) (UREA), гр. (N – 46,0%) НІТРОГЕНМУВЕК ЗРТ (NITROGENMUVEK ZRT), Угорщина	150 – 300 кг/га	Зернові культури	Основне підживлення та підживлення під час вегетації	4 (з періодом 1 раз на 2 тижні)
27.	Аміачна селітра (нітрат амонію) (Ammonium nitrate), гр. (N – 34,0%) НІТРОГЕНМУВЕК ЗРТ (NITROGENMUVEK ZRT), Угорщина	200 – 400 кг/га	Зернові культури	Основне внесення та підживлення під час вегетації	3 (з періодом 1 раз на місяць)
28.	НІТРОСОЛ 30 (КАРБАМІДНО-АМІАЧНА СУМІШ (КАС-30) (UAN-30%), р. (N – 30,0%) НІТРОГЕНМУВЕК ЗРТ (NITROGENMUVEK ZRT), Угорщина	30 – 200 л/га	Зернові культури	Підживлення під час вегетації	4 (з періодом 1 раз на 2 тижні)
29.	UNITEQ, р. (N – 35%, P ₂ O ₅ – 35%, K ₂ O – 35%, SO ₃ – 25%, CaO – 14%, MgO – 16,6%, B – 15%, Fe – 10%, Mn – 10%, Cu – 10%, Zn – 40 %, Mo – 5 %, Co – 0,01%, SiO ₂ – 2%, органічні кислоти – до 30%, ПАР (поверхнево активні речовини, прилипачі та речовини які зменшують поверхневий натяг) – до 10%, фітогормони – до 0,5%) ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», Україна	1,0 – 10,0 л/га	Зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури	Кореневе підживлення	3 – 4
		0,5 – 2,0 л/га		Позакореневе підживлення	
30.	Еверріс (Енго), гр. (марки: Osmocote, Pro Turf) (N – 0 – 40%, P ₂ O ₅ – 0 – 52%, K ₂ O – 5 – 45%, S – 1 – 10%, CaO – 1 – 15%, Na ₂ O – 0,1 – 0,5%, B – 0,001 – 0,05%, Co – 0,001 – 0,05%, Cu – 0,001 – 0,05%, Zn – 0,001 – 0,05%, Fe – 0,04 – 2,0%, Mn – 0,001 – 0,5%, Mo – 0,001 – 0,01%) ТОВ «Енго», Україна	250 – 300 кг/га	Газонні трави (газон)	Пряме внесення під час вегетації	5
		400 – 500 кг/га	Декоративні рослини (самшит)	Пряме внесення під час вегетації	5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
31.	AMIBOOST, PK (марки: СТАРТ, РОЗВИТОК, АНТИСТРЕС, БАЛАНС, ВРОЖАЙ) (N – 3 – 6%, P ₂ O ₅ – 2 – 5%, K ₂ O – 1,5 – 4,0%, MgO – 0 – 2,3%, амінокислоти – 9 – 30%) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	<i>Марка ВРОЖАЙ</i>			
		0,5 – 2,0 л/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка АНТИСТРЕС</i>			
		0,5 – 2,0 л/га	Зернові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка БАЛАНС</i>			
		0,5 – 3,0 л/га	Ягідні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		<i>Марка РОЗВИТОК</i>			
		0,5 – 3,0 л/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
32.	Solbion Plus, п. (марки: High N, High P, High K) (N – 1 – 35%, P ₂ O ₅ – 0 – 60%, K ₂ O – 0 – 46%, MgO – 0 – 1%, B – 0,01 – 0,03%, Cu (EDTA) – 0,01 – 0,04%, Fe (EDTA) – 0,075 – 0,25%, Mn (EDTA) – 0,05 – 0,065%, Mo – 0,001 – 0,01%, Zn – 0 – 0,01%, Zn (EDTA) – 0,01 – 0,013%, амінокислоти, вітаміни B ₂ , B ₆ , B ₁₂) ТОВ «ПРОГРІН» Україна	0,5 – 3,0 л/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		50 – 200 г/100 л води	Овочеві культури закритого ґрунту (томати)	Кореневе підживлення	-
33.	BEOZ LQ, п. (марки: ADAMITE, GARNET, GOLDSTONE, MOONSTONE) (N – 2,2 – 7,5%, K ₂ O – 2,07 – 3,5%, SO ₃ – 0,68 – 0,92%, Zn – 0,43 – 0,58%, Mn – 0,85 – 1,15%, Cu – 0,09 – 0,12%, B – 0,04 – 0,06%, Mo – 0,09 – 0,12%, C – 8,8 – 26,9%, амінокислоти, екстракт морських водоростей, фульвокислоти) ICL Europe Coöperatief U.A., Нідерланди	0,5 – 5,0 л/га	Зернові культури (кукурудза)	Позакореневе підживлення	1 – 6
		1,0 – 5,0 л/га	Овочеві культури (томати)	Фертигація	1 – 6
34.	BEOZ WS, п. (марки: Nephrite, Coral) (N – 0,85 – 4,18%, P ₂ O ₅ – 5,58 – 6,42%, K ₂ O – 3,6 – 18,9%, MgO – 0,85 – 3,3%, SO ₃ – 1,17 – 2,6%, Zn – 0,21 – 6,42%, B – 0,42 – 0,57%, Mo – 9,3 – 10,7%, Ni – 1,35 – 1,65%, Co – 0,42 – 0,58%, Se – 0,21 – 0,28%, C – 17,1 – 18,9%) ICL Europe Coöperatief U.A., Нідерланди	0,3 – 1,0 кг/га	Зернобобові культури (соя)	Позакореневе підживлення	1 – 2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
35.	LIQA, р. (марки: LIQA NPK(S) + ME; LIQA S 8:24; LIQA S 9:28; LIQA K + 5-20-5; LIQA H 3-18-18) (N – 0 – 35%; P ₂ O ₅ – 0 – 37%; K ₂ O – 0 – 35%; S – 0 – 15%; CaO – 0 – 10%; MgO – 0 – 10%; Na ₂ O – 0 – 5%; Cl ⁻ – 0 – 5%; B – 0 – 4%; Zn – 0 – 4%; Mo – 0 – 2%; Mn – 0 – 2%; Cu – 0 – 2%; Fe – 0 – 2%; SiO ₂ – 0 – 2%; Co – 0 – 1%; Ni – 0 – 0,1%; I – 0 – 0,1%; Se – 0 – 0,05%; C _{орг.} – 0 – 20%; гумінові кислоти – 0 – 10%; фульвові кислоти – 0 – 10%; амінокислоти/білкові гідролізати – 0 – 15%; екстракт морських водоростей – 0 – 5%; органічні кислоти – 0 – 10%; хітозан – 0 – 1%; фітогормони – 0 – 0,05%; інгібітори уреаз (NBPT, NPPT) – 0 – 1%; інгібітори нітрифікації (DMPP, DMPSA, DCD, нітрапірин) – 0 – 1%; поліаспарагінова кислота (PASP/K-PASP), малеїново-ітаконовий колполімер (MIA), фосфонати (HEDP, ATMP, DTPMP) – 0 – 5%) ТОВ «ЕВЕР-АГРО», Україна	20,0 – 60,0 л/га 2,0 – 5,0 л/га	Зернові культури (кукурудза)	Припосівного внесення Позакореневе підживлення	1 1 – 3
36.	MICROART, р. (марки: СЛІК-МАКСІ, БОРАМІД, ЦИНКАМІД, СЛІК-ЦИНК, СЛІК-ФЕРУМ) (N – 0 – 15%; P ₂ O ₅ – 0 – 10%; K ₂ O – 0 – 25%; SO ₃ – 0 – 12%; CaO – 0 – 6%; MgO – 0 – 6%; Na ₂ O – 0 – 10%; Cl ⁻ – 0 – 5%; B – 0 – 12%; Zn – 0 – 9%; Mo – 0 – 6%; Mn – 0 – 6%; Cu – 0 – 9%; Fe – 0 – 6%; SiO ₂ – 0 – 2%; Co – 0 – 2%; Ni – 0 – 0,1%; I – 0 – 0,2%; Se – 0 – 0,05%; C _{орг.} – 0 – 20%; гумінові кислоти – 0 – 10%; фульвові кислоти – 0 – 10%; амінокислоти/білкові гідролізати – 0 – 15%; екстракт морських водоростей (<i>Ascophyllum nodosum</i> , <i>Ecklonia maxima</i>) – 0 – 5%; органічні кислоти (лимонна, яблучна, глюконова, янтарна, винна – 0 – 10%; хітозан – 0 – 1%; фітогормони (ауксини, цитокініни, гібереліни, брасиностероїди) – 0 – 0,05% кожен; інгібітори уреаз (NBPT, NPPT) – 0 – 1%; інгібітори нітрифікації (DMPP, DMPSA, DCD, нітрапірин) – 0 – 1%; поліаспарагінова кислота (PASP/K-PASP), малеїново-ітаконовий	0,5 – 2,0 л/га	Олійних культур (соняшник)	Позакореневе підживлення	1 – 2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
	колполімер (MIA), фосфонати (HEDP, ATMP, DTPMP) – 0 – 5%) ТОВ «ЕВЕР-АГРО», Україна				
37.	НАЙС, РК (марки: Технічні, Злаки, Марганець Про) (N – 3,5 – 10%, Cu – 0 – 0,5%, Zn – 0 – 2,0%, Fe – 0 – 0,3%, Mn – 0,5 – 5,0%, Mo – 0 – 0,005%, MgO – 0 – 3,5%, B – 0 – 1,5%, SO ₃ – 7,0 – 8,0%) ТОВ «Білоцерківський завод препаративних форм», Україна	<i>Марка Технічні</i>			
		1,5 – 3,0 л/га	Ріпак	Позакореневе підживлення (фази формування розетки, відновлення весняної вегетації, стеблуння та початок бутонізації)	2 – 3
		1,5 – 3,0 л/га	Соняшник	Позакореневе підживлення (фази 2 – 3 пари листка, ріст стебла та формування зірочки)	2 – 3
		1,5 – 3,0 л/га	Соя	Позакореневе підживлення (фази 3 – 5 трійчастий листок, гілкування, бутонізація, розвиток бобів та налив бобів)	2 – 3
		<i>Марка Злаки</i>			
		1,5 – 3,0 л/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення (фази формування 3 – 5 листків, 6 – 7 листків, 8 – 10 листків та перед викиданням волоті)	2 – 3
		1,5 – 3,0 л/га	Пшениця	Позакореневе підживлення (фази початок кушення, вихід в трубку та прапорцевий листок)	2 – 3
		<i>Марка Марганець Про</i>			
		0,5 – 2,0 л/га	Зернові колосові культури (пшениця озима)	Позакореневе підживлення (восени – початок кушення (за 2 тижні до припинення вегетації); навесні – фази кушення, вихід у трубку та прапорцевий листок)	2 – 4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
38.	ЗЕРИВА, КЕ (марки: РизоГумат, Ризо-Бор-Молібден, Арія, Віасил, Біолон) (солі гумінових і фульвових кислот – 0 – 75%; N – 0 – 5%; P ₂ O ₅ – 0 – 5%; K ₂ O – 0 – 5%; B – 0 – 15%; SO ₃ – 0 – 2%; MgO – 0 – 1%; CaO – 0 – 2%; Fe – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 1%; Mn – 0 – 10,6%; Zn – 0 – 1,2%; Cu – 0 – 0,7%; Co – 0 – 0,53%; SiO ₂ – 0 – 0,2%; органічні кислоти – 0 – 3%; амінокислоти – 0 – 2%; L- амінокислоти – 0 – 10%; ГіФ кислоти – 0 – 11%; фітогормони – 0 – 0,5%; витяжки ялицевої хвої – 0 – 1%; крезацин – 0 – 0,5%) ТОВ «ЗЕРИВА», Україна	1 л/т	Соя	Обробка насіння	1
		1,0 л/га	Соя	Позакореневе підживлення	2
39.	Косайд® 4000, гр. (мідь у формі Cu(OH) ₂ , 538 г/кг) Cosaco LLC, США	0,2 – 0,4 кг/га	Зернові колосові культури, кукурудза	Позакореневе підживлення (у період від фази початку кущення до фази першого вузла 1 см вище вузла кущення)	2
40.	Амісил, р. (N – 55 г/л; B – 0,3 г/л; Mn – 5,0 г/л; Zn – 3,0 г/л; органічна речовина – 20 г/л; амінокислоти – 200 г/л) ТОВ «Хімагромаркетинг», Україна	1,0 – 2,0 л/га	Соняшник	Позакореневе підживлення (2 – 3 пари листків (BVCH 14-16) та/або 5 – 6 пар листків (10 – 12 листків) (BVCH 30-33))	1 – 2
		1,0 – 2,0 л/га	Ріпак озимий, ріпак ярий, гірчиця	Позакореневе підживлення (весняна розетка – стеблуння (BVCH 21-39) та/або бутонізація (перед цвітінням) (BVCH 50-61))	1 – 2
		1,0 – 2,0 л/га	Соя, горох	Позакореневе підживлення (3 – 5 трійчасті листки (BVCH 14-16) та/або бутонізація – початок цвітіння (BVCH 51-61))	1 – 2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
41.	NEO, р. (марки: CORE, FLORA, VIVO) (N – 0,45 – 2,5%; K ₂ O – 3,9 – 5,8%; Zn EDTA – 0 – 1,0%; Zn – 0 – 1,0%; B – 0 – 1,1%; Mg – 0 – 0,25%; Mn EDTA – 0 – 1,0%; Mn – 0 – 1,0%; C – 6,8 – 13,3%; амінокислоти – 0 – 15,0%) ТОВ «АгріСол», Україна	<i>Марка Vivo</i>			
		1,0 – 3,0 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	1
		1,0 – 3,0 л/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	2
		2,0 – 3,0 л/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	4
		2,0 – 3,0 л/га	Ягідні культури	Позакореневе підживлення	4
		2,0 – 4,0 л/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	4
		<i>Марки Core та oFlora</i>			
		2,0 – 4,0 л/га	Овочеві культури	Фертигація	6
		2,0 – 4,0 л/га	Ягідні культури	Фертигація	6
		6,0 – 8,0 л/га	Плодові культури	Фертигація	6
42.	AuraTech, р. (марки: B, MIX, Zn) (Zn – 0 – 15,0%; B – 0 – 10,0%; Fe – 0 – 4,0%; Cu – 0 – 0,3%; Mn – 0 – 2,0%; Mo – 0 – 0,05%) ПрАТ «Агріматко-Україна», Україна	<i>Марка Zn</i>			
		1,0 – 2,0 л/га	Кукурудза	Позакореневе підживлення	2
		<i>Марка B</i>			
		0,5 – 1,5 л/га	Соняшник	Позакореневе підживлення	3
		<i>Марка MIX</i>			
		1,0 – 3,0 л/га	Соя	Позакореневе підживлення	3
43.	Добриво на основі гумату калію «LEAF FORTE», р. (марки: «Гумат Форте», «Гумат Лист», «Гумат Грунт», «Гумат Бор») (N – 3,0 – 5,0%; P ₂ O ₅ – 10,0%; K ₂ O – 5,0 – 7,0%; MgO – 2,0 – 2,6%; SO ₃ – 1,0 – 3,6%; B – 0,02 – 11,0%; Fe – 0,01 – 0,2%; Cu – 0,01 – 0,41%; Mn – 0,03 – 0,3%; Zn – 0,01 – 0,48%; Mo – 0,001 – 0,05%; Co – 0,005 – 0,06%; гумінові кислоти – 1,0 – 1,5%) ТОВ «НБК «Ліст Форте», Україна	<i>Марка «Гумат Форте»</i>			
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Гумат Лист»</i>			
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Гумат Грунт»</i>			
		2,0 – 10,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Внесення під передпосівну культивуацію	1
		1,5 – 2,5 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		<i>Марка «Гумат Бор»</i>			
		0,5 – 1,5 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	1 – 3
		1,0 – 1,5 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	1 – 3
44.	Добриво «LEAF FORTE», р. (марки: «Універсальне», «Комплексне», «Спеціальне», «Макродобриво», «Монохелатне») (N – 0 – 40,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 50,0%, K ₂ O – 0 – 36,0%, MgO – 0 – 8,5%, SO ₃ – 0 – 20,0%, B – 0 – 140,0 г/л, Fe – 0 – 35,0 г/л, Cu – 0 – 80,0 г/л, Mn – 0 – 55,0 г/л, Zn – 0 – 110,0 г/л, Mo – 0 – 37,0 г/л, Co – 0 – 50,0 г/л, гумінові кислоти – 3,0 – 6,0 г/л) ТОВ «НБК «Ліст Форте», Україна	<i>Марка «Універсальне»</i>			
		1,0 – 3,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		20,0 – 40,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Комплексне»</i>			
		1,0 – 3,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		20,0 – 40,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Спеціальне»</i>			
		0,5 – 3,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		20,0 – 40,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Макродобриво»</i>			
		1,0 – 4,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		20,0 – 40,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Монохелатне»</i>			
		0,5 – 1,0 л/га	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		5,0 – 10,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
45.	Добриво рідке азотне із сіркою (КАС+S), р. (N – 24,5%, S – 3,4%) ТОВ «УТК Хімальянс», Україна	100,0 – 150,0 л/га	Зернові колосові культури	Основне внесення	1
		30,0 – 50,0 л/га	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2
46.	Супер Старт (Super Start) NP 10:35 + 2%MgO + 5%S + 2%Zn, гр. (N-NH ₄ – 10,0%, P ₂ O ₅ – 35,0%, MgO – 2,0%, S – 5%, Zn – 2,0%) ТОВ «Астракем-Україна», Україна	15,0 – 30,0 кг/га	Кукурудза	Основне внесення в рядки	1
47.	Біогловіт, р. (марки: Універсальне, Азот, NPK, Цинк, Бор Плюс, Калій), р. (N – 0 – 400,0 г/л, P ₂ O ₅ – 0 – 500,0 г/л, K ₂ O – 0 – 360,0 г/л, Mn – 0 – 1,5 г/л, Zn – 0 – 110,0 г/л, Cu – 0 – 1,5 г/л, Co – 0 – 0,2 г/л, Fe – 0 – 5,0 г/л, Mo – 0 – 0,25 г/л, B – 0 – 140,0 г/л, MgO – 0 – 43,0 г/л, CaO – 0 – 40,0 г/л, SO ₃ – 0 – 8,5 г/л, гумінові кислоти – 10,0 – 30,0 г/л) ФО-П Луценко А.А., Україна	Марка «Універсальне»			
		1,0 – 4,0 л/га	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		1,0 – 8,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		Марка «Азот»			
		1,0 – 5,0 л/га	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		1,0 – 8,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		Марка «NPK»			
		1,0 – 2,5 л/га	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		1,0 – 8,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		Марки «Цинк», «Бор плюс» та «Калій»			
		1,0 – 3,0 л/га	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		1,0 – 8,0 л/га	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
48.	Бест, п. (марки: Тріко, Ризо) (K ₂ O – 7,0 – 7,5%, гумінові кислоти – 45,0 – 55,0%, фульвокислоти – 5,0 – 20,0%, Bacillus subtilis IAB/BSF1 – 0 – 1*10 ⁷ КУО/г, Trichoderma harzianum IABTH01 – 0 – 2*10 ⁷ КУО/г) Квімікас Мерістем (Químicas Meristem, S.L.), Іспанія	0,2 – 1,0 кг/га	Овочеві культури	Кореневе підживлення (з інтервалом між обробками 7 – 10 днів)	2 – 3
		0,2 – 1,0 кг/га	Плодові культури	Кореневе підживлення (з інтервалом між обробками 15 – 20 днів)	2 – 3
		0,2 – 1,0 кг/га	Ягідні культури	Кореневе підживлення (з інтервалом між обробками 10 – 15 днів)	2 – 3
49.	ГуміСил (GumiSil), р. (марки: Моно-Мідь, Моно-Молібден, N) (N – 3,0 – 20,0%, Cu – 0 – 2,0%, Мо – 0 – 10,0%, гумінові кислоти – 5 – 10 г/л) ТОВ «Агропромисловий центр-Гарант», Україна	Марки Моно-Молібден та Моно-Мідь			
		1,0 – 1,5 л/га	Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	3
		2,0 – 2,5 л/га		Кореневе підживлення	3
		Марка N			
		3,0 – 4,0 л/га	Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	3
		4,0 – 6,0 л/га		Кореневе підживлення	3
50.	Лідер Пульс Енерджі, р. (N – 28 г/л, P ₂ O ₅ – 56,34 г/л, K ₂ O – 79,7 г/л, Mg – 0,444 г/л, Cu – 0,246 г/л, S – 1,2 г/л, Mn – 0,368 г/л, Fe – 0,0966 г/л, Zn – 0,368 г/л, Mo – 0,035 г/л, Co – 0,0377 г/л, B – 0,315 г/л, гетероауксин (β-індолилцетова кислота) – 1,5 г/л, нафтилоцетова кислота – 1,5 г/л, бурштинова кислота – 6 г/л, саліцилова кислота – 6 г/л, аспарагінова кислота – 6 г/л, суміш натрієвих солей: 2-нітрофенолу – 0,68 г/л, 4-нітрофенолу – 0,68 г/л, 2,4-динітрофенолу – 0,68 г/л, гумат калію – 60 г/л, N-окис 2,6 диметилпіридину – 0,2–0,3 г/л, амінокислоти – 15,12 г/л, гіберелові кислоти – 1,2 г/л, екстракт морських водоростей – 60 г/л, силікат натрію – 20 г/л, поліетиленгліколь (ПЕГ-400) – 100 г/л, поліетиленгліколь (ПЕГ-1500) – 100 г/л, 20% ізопропанольний розчин біологічних речовин продуктів метаболізму ендогенних грибів – 50 г/л) ТОВ «НВП «Агротехнології», Україна	0,5 – 2,0 л/га	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
51.	Оларсе, р. (Fe – 1,0%, Zn – 1,0%, Mo – 0,03%, органічні речовини – 400 г/л) ПП «Земельний капітал», Україна	5,0 – 12,0 л/га	Технічні культури (у т.ч. буряки цукрові)	Кореневе підживлення	2 – 5
52.	Аскофілд, р. (марки: Органік (CS1), Плюс (CS2)) (N – 0,1 – 2,0%; P – 0,1 – 2,0%; K – 0,5 – 2,0%; S – 1500,0 – 3000,0 ppm; Zn – 0,1 ppm; B – 2,0 – 10,0 ppm; Mg – 650,0 – 1000,0 ppm; Ca – 600,0 – 1000,0 ppm; Fe – 100,0 ppm; Cu – 0,5 – 6,0 ppm; Mn – 3,0 – 5,0 ppm; Mo – 0,1 ppm; амінокислоти – 0,1 г/100 мл; альгінова кислота – 8,0 – 10,0 г/100 мл; фукоїдан – 2,0 г/100 мл; ламінарин – 2,0 г /100 мл; манітол – 2,0 г/100 мл; цитокініни – 15,0 – 20,0 мг/100 мл; гібереліни – 5,0 – 10,0 мг/100 мл; ауксини – 15,0 – 20,0 мг/100 мл; бетаїн – 50,0 – 70,0 ppm; брасиностероїди – 0,2–0,5 мг/100 мл; абсцизова кислота – 9,0–12,0 мг/100 мл; стріголактони – 1,5–2,0 мг/100 мл; органічна речовина – 4,0%) Ifagri Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	1,0 – 2,0 л/га	Овочеві культури	Кореневе та позакореневе підживлення (перший обробіток через 2 – 3 тижні після появи сходів)	1 – 3
		1,0 – 2,0 л/га	Зернові, олійні, технічні культури	Кореневе та позакореневе підживлення (у стадіях 2 – 5 листків)	2 – 3
		0,5 л/га	Плодово-ягідні культури	Кореневе та позакореневе підживлення (від фази зеленого суцвіття до зав’язування плодів)	2 – 4
53.	Luronchem, п. (марки: 20-20-20+TE, 10-10-40+TE, 13-40-13+TE, 12-11-18+TE) (N – 10,0 – 20,0%; P ₂ O ₅ – 10,0 – 40,0%; K ₂ O – 13,0 – 40,0%; SO ₃ – 0 – 32,0%; Zn – 0,05%; B – 0,2%; Mn – 0,05%; Mo – 0,005%) ТОВ «Укрзовнішхімпром», Україна	Марка 20-20-20+TE			
		2,0 – 4,0 кг/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		4,0 – 6,0 кг/га		Фертигація	1 – 4
		Марка 13-40-13+TE			
		1,5 – 3,0 кг/га	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		2,0 – 3,0 кг/га		Фертигація	1 – 4
		Марка 10-10-40+TE			
		1,5 – 3,0 кг/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		Марка 12-11-18+TE			
2,0 – 4,0 кг/га	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 4		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
54.	СТАНДАРТ NPK, кр. (марки: N, P, K, B, ME) (N – 0 – 45%; P ₂ O ₅ – 0 – 45%; K ₂ O – 0 – 50%; S – 0 – 30%; Mg – 0 – 5%, Cu – 0 – 0,05%; Zn – 0 – 0,1%; Mn – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 0,005%; Fe – 0 – 20%, B – 0 – 21%, Ca – 0 – 35%) ТОВ-фірма «Агрохімпарк», Україна	90 – 135 кг/га	Зернові культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		1,0 – 6,0 кг/га		Позакореневе підживлення (концентрація розчинів 0,3 – 3,0%)	3
		90 – 180 кг/га	Технічні культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		60 – 120 кг/га	Овочеві культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		1,0 – 6,0 кг/га		Позакореневе підживлення (концентрація розчинів 0,3 – 3,0%)	4
		1,0 – 40,0 кг/га		Фертигація (концентрація розчинів 0,005 – 0,3%)	
		0,2 – 6,0 кг/ 100 м ² / 200 л води		Кореневе підживлення	
		30 г/м ²	Декоративні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,2 – 6,0 кг/ 100 м ² / 200 л води		Кореневе підживлення	3
		0,01 – 0,2 кг/ 100 м ² / 5 л води		Позакореневе підживлення	3 – 4
		30 г/м ²	Газонна трава	Кореневе підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,2 – 6,0 кг/ 100 м ² / 200 л води		Кореневе підживлення в період вегетації	3 – 4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		25 г/м ² /5 л води	Квіткові рослини	Кореневе підживлення	3 – 4
		30 г/дерево	Хвойні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4
55.	СТАНДАРТ NPK, гр. (марки: N, P, K, S, ME) (N – 0 – 45%; P ₂ O ₅ – 0 – 45%; K ₂ O – 0 – 50%; S – 0 – 10%; Mg – 0 – 5%, Cu – 0 – 0,05%; Zn – 0 – 0,1%; Mn – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 0,005%) ТОВ-фірма «Агрохімпарк», Україна	90 – 135 кг/га	Зернові культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування та підживлення в період вегетації	3 – 4
		90 – 180 кг/га	Технічні культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування та підживлення в період вегетації	3 – 4
		60 – 120 кг/га	Овочеві культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивування та підживлення в період вегетації	3 – 4
		30 г/м ²	Декоративні культури, газонна трава	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		25 г/м ²	Квіткові рослини	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		30 г/дерево	Хвойні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4
56.	Біоспліто, р. (гумат калію – 1%, суміш ензимів – не менше 18,8%) ЗАТ «Нандо», Литва	1,0 – 2,0 л/га	Зернові колосові культури	Основне внесення в ґрунт, обприскування соломи та післяживних решток	1
57.	KSC ФІТ-актіл, гр. (марки: KSC I ФІТ-актіл, KSC II ФІТ-актіл, KSC III ФІТ-актіл, KSC V ФІТ-актіл, KSC VII Перла ФІТ-актіл, KSC Мікс ФІТ-актіл) (N – 0 – 23%, P ₂ O ₅ – 0 – 40%, K ₂ O – 0 – 42%, SO ₃ – 0 – 29%, MgO – 0 – 15%, CaO – 0 – 20%, B – 0 – 0,5%, Cu – 0 – 0,5%, Fe – 0 – 2,5%, Mn – 0 – 2%, Mo – 0 – 0,2%, екстракт морських водоростей – 0,7%) Тімак Агро Україна, Україна	2,0 – 50,0 кг/га	Овочеві культури закритого та відкритого ґрунту, плодові культури	Крапельне зрошування в період вегетації	2 – 15



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
58.	Бріо S, р. (N – 15%, SO ₃ – 33%, екстракт морських водоростей – 7,8%, екстракт рослин – 18,3%) Тімак Агро Україна, Україна	15 – 30 л/га	Ріпак	Кореневе підживлення	1 – 3
		10 – 30 л/га	Зернові культури	Кореневе підживлення	1 – 3
59.	Фертіактіл GZ, р. (N – 13%, K ₂ O – 5%, гумінова кислота – 11,6%, екстракт рослин – 1,3%) Тімак Агро Україна, Україна	5,0 л/га	Овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	Кореневе підживлення, крапельне зрошування упродовж вегетації з інтервалом 14 дів	2 – 7
		3,0 – 10,0 л/га	Технічні культури	Кореневе підживлення	1 – 2
		2,0 – 3,0 л/га	Зернові культури	Кореневе підживлення	1
60.	ЗЕО, р. (марки: ЗЕОСАН, ЗЕОЗЕРНО) (SO ₃ – 0 – 14%, СаО – 10%, В – 0 – 4%, Мо – 0 – 0,4%, MgO – 0 – 7%, SiO ₂ – 10%, екстракт рослин – 6,5 – 7%) Фертілайн, Франція	2,5 – 5,0 л/га	Зернові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		2,5 л/га	Технічні культури	Позакореневе підживлення	2
61.	БОРО, р. (марки: БОРОЛАЙН, БОРОМОЛАЙН) (В – 8 – 11%, Мо – 0 – 0,6%) Фертілайн, Франція	0,5 – 2,0 л/га	Зернові культури	Позакореневе підживлення	1
		2,0 л/га	Зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1
		3,0 л/га	Олійні, технічні, кормові культури, картопля	Позакореневе підживлення	1
62.	Бороніафос, р. (P ₂ O ₅ – 6,7 – 7,7%, В – 7,9 – 8,9%) Агронутрісіон, Франція	2,0 л/га	Олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		2,0 – 3,0 л/га	Технічні культури, картопля	Позакореневе підживлення	1 – 2
		2,0 л/га	Соя	Позакореневе підживлення	1
63.	Перлгумус, гр. (марки: Перлгумус ГР, Перлгумус Плюс ГР) (N _{амідний} – 0 – 6%, P ₂ O ₅ – 0,5 – 12%, K ₂ O – 3 – 15%, SiO ₂ – 3 – 30%, гумінові речовини – 300 – 700 г/кг) ТОВ «Агротехносоюз», Україна	50,0 – 250,0 кг/га	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
64.	«Українські Гумати», Р. (N – не менше 0,1%, K ₂ O – не менше 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%) ФОП Голубокий В.Ф., Україна	0,2 л/т	Зернові колосові культури, кукурудза, технічні (в т.ч. соняшник, ріпак), зернобобові (в т.ч. соя) культури, картопля	Обробка насіння (бульб)	1
		0,2 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		0,15 л/га	Зернові колосові, технічні (в т.ч. соняшник, ріпак), зернобобові (в т.ч. соя), овочеві, плодові культури, кукурудза, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
65.	SeaWinner 818, р. (N – 1%, K ₂ O – 20%, Ca – 0,2%, Mg – 0,5%, B – 0,5%, Zn – 0,5%, Fe – 0,6%, амінокислоти – 4,0%, альгінова кислота – 30%, органічна речовина – 26%) ТОВ «Техсистеми», Україна	0,2 – 1,0 л/га	Пшениця озима, ріпак озимий, соняшник, соя, кукурудза	Позакореневе підживлення	3
66.	SeaFun, р. (N – 90 г/л, P ₂ O ₅ – 30 г/л, K ₂ O – 60 г/л, Mg – 1,08 г/л, Cu – 1,35 г/л, Zn – 2,0 г/л, Fe – 5,12 г/л, Mn – 0,6 г/л, екстракт морських водоростей з альгіновою кислотою – 14 г/л, органічна речовина – 100 г/л) ТОВ «Техсистеми», Україна	0,5 – 1,5 л/га	Пшениця озима, ріпак озимий, соняшник, соя, кукурудза	Позакореневе підживлення	3
67.	Seaweed Boron, р. (бор (B ₂ O ₃) – 400 г/л, екстракт морських водоростей – 200 г/л, органічна речовина – 130 г/л) ТОВ «Техсистеми», Україна	0,3 – 1,0 л/га	Пшениця озима, ріпак озимий, соняшник, соя, кукурудза	Позакореневе підживлення	3
68.	Екоплант-Гумі, гр. (K ₂ O – 25%, P ₂ O ₅ – 2%, CaO – 10%, MgO – 8%, S – 4%, Bo – 0,05 – 0,27%, Zn – 0,03%, Mn – 0,018%, гумінові речовини – 4 – 7%) ТОВ «ОРІЙ», Україна	300 кг/га	Зернові культури (ячмінь ярий), кукурудза, соняшник, соя	Основне внесення або внесення під культивування	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
69.	ОРГАНИЦЯ Мікс, п. («Infinity», «Інокула», «Mega Harvest/Combo», «Азотікс», «Метабо/Почво») (N – 0 – 20%; P ₂ O ₅ – 0 – 20%; K ₂ O – 0 – 20%; S – 0 – 15%; Ca – 0 – 15%; B – 0 – 15%; Zn – 0 – 15%; Fe – 0 – 15%; Co – 0 – 5%; Cu – 0 – 10%; Mn – 0 – 15%; Mg – 0 – 15%; Mo – 0 – 15%; Si – 0 – 15%; гумат калію 0 – 20%; органічні речовини 0,1 – 80%; органічні кислоти – 0 – 20%; амінокислоти 0 – 20%; комплекс мікроорганізмів (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> БТА 014, <i>Trichoderma viride</i> БТА 004, <i>Trichoderma harzianum</i> БТА 015, <i>Rhizobium leguminosarum</i> БТА 012, <i>Bradyrhizobium japonicum</i> БТА 001, <i>Bradyrhizobium japonicum</i> БТА 010, <i>Bacillus subtilis</i> BD 18002, <i>Azospirillum brasilense</i> БТА 013, <i>Azotobacter chroococcum</i> БТА 008, <i>Bacillus megaterium</i> БТА 007, <i>Bacillus licheniformis</i> BD 18101, <i>Pseudomonas fluorescens</i> БТА 019, <i>Coniothyrium minitans</i> БТА 016, <i>Bacillus thuringiensis</i> БТА 002, <i>Beauveria bassiana</i> БТА 005, <i>Metarhizium anisopliae</i> БТА 008, <i>Pseudomonas putida</i> БТА 020, <i>Arthrobotrys oligospora</i> БТА 017, <i>Purpureocillium lilacinum</i> БТА 018, <i>Rhizobium phaseoli</i> БТА 011, <i>Streptomyces avermitilis</i> БТА 003) – титр – не менше 1*10 ⁷ КУО/г) ПП «Біотех Актив», Україна	Марка «Infinity»			
		0,3 – 5,0 кг/га	Соняшник	Позакореневе підживлення	5
		Марка «Інокула»			
		1,0 – 1,5 кг/т	Ріпак ярий	Обробка насіння	1
		Марка «Mega Harvest/Combo»			
		0,3 – 5,0 кг/га	Соняшник	Позакореневе підживлення	5
		Марка «Азотікс»			
		1,0 – 1,5 кг/т	Соя, горох, квасоля	Обробка насіння	1
		Марка «Метабо/Почво»			
		0,3 – 5,0 кг/га	Кукурудза	Прикореневе внесення	5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Добрива для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м ² , мл/100 м ² , г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Кайші Макс, МГ (L-вільні амінокислоти – 80% w/w, N _{заг.} – 13% w/w) Хешенбіхлер ГмбХ, Австрія	30 – 50 г/ 4 – 5 л води/ 100 м ²	Картопля, томати	Обприскування в період вегетації (стимулювання росту та розвитку рослини, посилення стійкості культури до стресових факторів, покращення фізіологічних процесів, підвищення врожайності)	4
		30 – 60 г/ 8 – 10 л води/ 100 м ²	Яблуня, виноградники		4
2.	Фітомаре, р. (N – 5,5%, P ₂ O ₅ – 3%, K ₂ O – 3,5%, B – 0,35%, Mo – 0,2%, органічна речовина – 8%, вільні амінокислоти – 2%, екстракт водоростей – 15%) АТЛАНТИКА АГРІКОЛА (ATLANTICA AGRICOLA S.A.), Іспанія	20 – 30 мл/100 м ² (0,02 – 0,03 л / 10 л води)	Плодові культури (яблуня, персик)	Позакореневе підживлення	3
		20 – 30 мл/100 м ² (0,05 – 0,075 л / 10 л води)	Овочеві культури (томати, перець)	Позакореневе підживлення	1
3.	BRANDT InVigo (БРЕНДТ ІнВіго), р. (N – 2,5%, N _{орг.} – 1,5%, Fe – 2%, Mn – 0,5%, Zn – 0,5%, вільні амінокислоти (Proline) – 0 – 6%, AATC (n-acetyl-thiazoline-4-carboxylic acid) – 5%) BRANDT EUROPE S.L., Іспанія	10 – 20 мл/100 м ²	Зернові (пшениця озима, кукурудза), зернобобові (соя), олійні (соняшник), технічні (буряки цукрові) культури	Кореневе підживлення	1 – 3
		10 – 20 мл/100 м ²	Овочеві(томати), плодові(яблуня), ягідні(суниця) культури	Кореневе підживлення	1 – 3
		10 мл/100 м ²	Овочеві(томати), плодові(яблуня), ягідні(суниця) культури	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
4.	«Комплекс Турбо Лайф», РК (марки: «Універсальний Турбо», «Буряковий Турбо», «Насіння Турбо», «Овочевий Турбо») (N – 14 – 150 г/л; P ₂ O ₅ – 65 – 115 г/л; K ₂ O – 45 – 105 г/л; MgO – 0,2 – 0,6 г/л; SO ₃ – 0,9 – 42 г/л; B – 0,4 – 2,8 г/л; Cu – 0,2 – 17,6 г/л; Fe – 0,6 – 2,5 г/л; Mn – 0,2 – 13,8 г/л; Mo – 0 – 1,5 г/л; Zn – 0,1 – 13,5 г/л; Co – 0 – 0,13 г/л; амінокислоти – 0 – 50 г/л; фітогормони – 0 – 0,05 г/л) ПП «НВО «АГРОБІОІННОВАТИКА», Україна	<i>Марка «Овочевий Турбо»</i>			
		10 – 15 мл/100 м ²	Овочеві культури, баштани	Обприскування в період вегетації	3
5.	«Лайф Перфект», РК (марки: «Бор Молібден», «Молібден Кобальт», «Цинк 120», «Кальцій 200») (N – 70 – 200 г/л; B – 0 – 150 г/л; Mo – 0 – 60 г/л; Co – 0 – 6,25 г/л; S – 0 – 125 г/л; Zn – 0 – 120 г/л; CaO – 0 – 200 г/л; MgO – 0 – 10 г/л) ПП «НВО «АГРОБІОІННОВАТИКА», Україна	<i>Марка «Кальцій 200»</i>			
		10 – 15 мл/100 м ²	Плодові культури, баштани	Обприскування в період вегетації	2
6.	«ІНТЕРМАГ НУТРІБУСТ», р. (марки: Зернові, Кукурудза, Соя, Олійні, Цукровий буряк, Картопля, Овочеві) (N – 5%; SO ₃ – 3,5 – 6,5%; Na ₂ O – 0 – 2,4%; B – 0,04 – 0,71%; Co – 0 – 0,07%; Cu – 0,2 – 0,7%; Fe – 0,33 – 1,7%; Mn – 0,85 – 1,7%; Zn – 1,0 – 2,65%; Mo – 0,007 – 0,021%; MgO – 2%) ТОВ «Інтермаг», Польща	<i>Марка Зернові</i>			
		10 мл/100 м ²	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Кукурудза</i>			
		10 мл/100 м ²	Кукурудза	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Соя</i>			
		10 мл/100 м ²	Зернобобові культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Олійні</i>			
		10 мл/100 м ²	Олійні культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Цукровий буряк</i>			
		10 мл/100 м ²	Буряки цукрові	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Картопля</i>			
		10 мл/100 м ²	Картопля	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3
		<i>Марка Овочеві</i>			
		10 мл/100 м ²	Овочеві культури	Позакореневе підживлення 0,5 – 1,5% водним розчином	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
7.	«ІНТЕРМАГ МАКРО», кр.п. (марки: ОПТІ, НІТРО, ФОСФО, КАЛІ) (N – 11 – 20%; P ₂ O ₅ – 12 – 53%; K ₂ O – 5 – 38%; B – 0,03%; Cu – 0,03%; Fe – 0,15%; Mn – 0,07%; Zn – 0,07%; Mo – 0 – 0,002%) ТОВ «Інтермаг», Польща	<i>Марка ОПТІ</i>			
		20 – 50 г/100 м ²	Пшениця яра (зернові колосові), ріпак ярый, соняшник (олійні)	Позакореневе підживлення	1 – 4
		<i>Марка НІТРО</i>			
		20 – 50 г/100 м ²	Пшениця яра	Позакореневе підживлення	1 – 4
		<i>Марка ФОСФО</i>			
		20 – 50 г/100 м ²	Кукурудза	Позакореневе підживлення	1 – 4
8.	Інтермаг, кр.п. (марки: Дропферт 18-18-18; Дропферт 4-40-13; Дропферт 9-10-36; Дропферт 14,5-7,5-18,5 (Лохина)) (N – 4 – 18%; P ₂ O ₅ – 7,5 – 40%; K ₂ O – 13 – 36%; MgO – 0 – 6%; SO ₃ – 0 – 21%; B – 0 – 0,02%; Cu – 0,01%; Fe – 0,12%; Mn – 0,06%; Mo – 0 – 0,003%; Zn – 0,025%) ТОВ «Інтермаг», Польща	<i>Марка КАЛІ</i>			
		20 – 50 г/100 м ²	Буряки цукрові	Позакореневе підживлення	1 – 4
		2 – 40 г/100 м ²	Зернові культури, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
		30 – 50 г/100 м ²	Зернобобові культури, кукурудза	Позакореневе підживлення	2 – 4
		20 – 50 г/100 м ²	Технічні культури	Позакореневе підживлення	2 – 4
		30 – 40 г/100 м ²	Овочеві культури, ягідники	Позакореневе підживлення	2 – 4
9.	Інтермаг, р. (марки: Бор, Гровон, Кальцій Турбо, Молібден, Плодово-Ягідні, Прімсід Мульти, Титаніт) (N – 0 – 8,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 35,0%, K ₂ O – 0 – 3,0%, S – 0 – 4,0%, Na ₂ O – 0 – 1,0%, B – 0 – 11,0%, Cu – 0 – 0,3%, Zn – 0 – 0,5%, Fe – 0 – 0,8%, Mn – 0 – 0,3%, Mo – 0 – 3,0%, MgO – 0 – 5,0%, Ti – 0 – 0,7%)	2 – 5 г/100 м ²	Овочеві, картопля, ягідники, плодови	Фертигація 0,05 – 0,15% водним розчином	2 – 4
		0,5 – 1,0% водний розчин	Декоративні культури	Фертигація	2 – 4
		2 – 3 мл/кг	Зернові, бобові, технічні, овочеві, культури	Обробка насіння (інкрустація)	1
9.		20 – 800 мл/100 м ²	Зернові (в т.ч. пшениця ячмінь, кукурудза), технічні (в т.ч. соняшник, ріпак, буряки цукрові), бобові (горох, соя), картопля, садові(в т.ч. яблуня, вишні), ягідники (в т.ч. малина, порічки, полуниця), овочеві культури відкритого та закритого ґрунту (в т.ч. цибуля, капуста, морква), декоративні рослини та газонні трави	Фертигація протягом вегетації, закритий ґрунт – одночасно з поливом 0,05 – 2,5% водним розчином добрива	3 – 7



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
10.	ОРАКУЛ, р. (марки: Мультикомплекс, Сірка Актив, В, Zn, P) (N – 2,3 – 15%; P ₂ O ₅ – 0 – 24%; K ₂ O – 0 – 3,5%; Na ₂ O – 0 – 4%; S – 0 – 15%; B – 0 – 11,2%; Co – 0 – 0,005%; Cu – 0 – 0,65%; Zn – 0 – 9%; Mo – 0 – 0,01%; Mn – 0 – 0,5%; Fe – 0 – 0,5%; ЕДТА – етилендіамінооцтова кислота, ОЕДФ – оксиетилендифосфорова кислота, суміш природних амінокислот, аліфатичні кислоти, коламін (моноетаноламін)) МП НДП «Долина», Україна	Марка Мультикомплекс			
		10 – 60 мл/100 м ²	Зернові, зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка Сірка Актив			
		10 – 60 мл/100 м ²	Ріпак ярий	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка В			
		10 – 60 мл/100 м ²	Соняшник	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка Zn			
		10 – 60 мл/100 м ²	Кукурудза	Позакореневе підживлення	1 – 3
11.	Гумекс Ультра, р. (гумінові та фульвові кислоти – 25 – 35%) МП НДП «Долина», Україна	Марка Р			
		10 – 60 мл/100 м ²	Пшениця озима	Позакореневе підживлення	1 – 3
12.	CrossAktiv (КросАктив), р. (марки: 6:22:5 + Zn, 5:20:5, 3:18:18) (N – 3 – 6%; P ₂ O ₅ – 18 – 22%; K ₂ O – 5 – 18%; Zn – 0,5%) ТОВ «АГРОТОК ЛТД», Україна	0,2 мл/ 1 л води/10 кг	Зернові, олійні, технічні, овочеві культури (пшениця яра, соняшник, буряки цукрові, томати)	Обробка насіння	1
		0,5 – 5 мл/100 м ²		Позакореневе підживлення	1 – 6
		Марка 3:18:18			
		0,2 – 0,5 л/100 м ²	Зернові колосові культури	Внесення в ґрунт при посіві	1
		Марка 6:22:5 + Zn			
13.	«ГРОУЛАЙН», р. (марки: Актив, Амінопро, Алгімакс, Максітріо, Аміномакс) (N – 0,5 – 10%, K ₂ O – 1,3 – 7,0%, C _{орг.} – 4,5 – 28%, амінокислоти – 0 – 60%, гумінові речовини – 0 – 24%, екстракт морських водоростей – 0 – 30%) ТОВ «ЕКООРГАНІК», Україна	0,2 – 0,5 л/100 м ²	Кукурудза	Внесення в ґрунт при посіві	1
		Марка 5:20:5			
		0,2 – 0,5 л/100 м ²	Соняшник	Внесення в ґрунт при посіві	1
14.	Плагрон (Plagron), р. (марки: Green Sensation, Hydro A, Hydro B, Power Buds, Power Roots) (N – 0,3 – 3,2%; P ₂ O ₅ – 0 – 8,3%; K ₂ O – 1,3 – 9,1%; SO ₃ – 0 – 2,8%; MgO – 0 – 1,4%; CaO – 0 – 5,9%; B – 0 – 0,007%; Zn – 0 – 0,01%; Fe – 0 – 0,9%; Cu – 0 – 0,004%; Mn – 0 – 0,034%; Mo – 0 – 0,0007%) ФОП Прокоф'єва К.А., Україна	5 – 20 мл/100 м ²	Кукурудза, пшениця, ріпак, соя, цукровий буряк, соняшник	Кореневе та позакореневе підживлення	1 – 3
		3,0 – 20,0 мл/ 100 м ²	Троянди	Позакореневе підживлення	4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
15.	НоваТек (NovaTec), гр. (марки: NovaTec Classic 12-8-16 (+3MgO+TE), NovaTec N-Max 24-5-5 (+2MgO+TE), NovaTec Premium 15-3-20 (+2MgO+TE), Easygreen Mini 21 21-5-10 (+3+TE), Easygreen Mini 12 12-12-17(+2+TE)) (N – 12,0 – 24,0%; P ₂ O ₅ – 3,0 – 12,0%; K ₂ O – 5,0 – 20,0%; S – 4,4 – 9,2%; SO ₃ – 0 – 23,0%; B – 0,02%; Zn – 0,01 – 0,02%; Fe – 0,06 – 0,3%, DMPSA – 0 – 0,6%) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	2,5 – 3,5 кг/ 100 м ²	Газонна трава, декоративні культури	Розсіювання або розкидання в період вегетації	3 – 6
16.	Басфоліар СП (Basfoliar SP), п. (марки: Basfoliar 7-12-40 SP; Basfoliar 13-40-13 SP; Basfoliar 20-19-19 SP; NovaTec Solub Complete 18-18-18; NovaTec Solub K-Max 10-5-30) (N – 7,0 – 20,0%; P ₂ O ₅ – 5,0 – 40,0%; K ₂ O – 10,0 – 40,0%; SO ₃ – 0 – 30,0%; MgO – 0 – 2,0%; B – 0,01%; Zn – 0,02 – 0,04%; Fe – 0,05 – 0,1%; Cu – 0,02 – 0,04%; Mn – 0,05 – 0,1%; Mo – 0,001 – 0,003%; DMPSA – 0 – 0,6%) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	20 – 40 г/100 м ²	Пшениця, кукурудза, соняшник, соя, цукровий буряк	Позакореневе підживлення	1 – 3
17.	Басфоліар (Basfoliar), р. (марки: Basfoliar Fruits SL, Basfoliar Mature SL, Basfoliar Si SL, Basfoliar Aktiv SL, Vitanica RZ) (N – 0 – 5,0%; P ₂ O ₅ – 0 – 40,0%; K ₂ O – 0,6 – 18,0%; MgO – 0 – 5,0%; B – 0 – 0,43%; Zn – 0 – 0,01%; Fe – 0 – 0,05%; Cu – 0 – 0,02%; Mn – 0 – 0,01%; Mo – 0 – 0,85%; SiO ₂ – 0 – 2,0%; Si – 0 – 0,93%; екстракт морських водоростей Ecklonia maxima – 0 – 30%; гліцин-бетаїн – 0 – 13,4%; пролін – 0 – 1,6%; <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> R6CDX [®] , титр – 1,2*10 ⁹ КУО/г) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	10 – 30 мл/ 100 м ²	Яблуня, персик, черешня, помідор, картопля	Позакореневе підживлення	3 – 5
		50 – 100 мл/ 100 м ²	Яблуня, персик, черешня, помідор, картопля	Краплинне зрошення	3 – 5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
18.	Басфоліар (Basfoliar), р. (марки: Basfoliar Avant Natur SL, Basfoliar Cereals SL, Basfoliar Excellent Flo, Basfoliar Kelp SL, Basfoliar Zn Flo) (N – 0 – 16,0%; P ₂ O ₅ – 0 – 1,3%; CaO – 0 – 12,3%; SO ₃ – 0 – 9,5%; MgO – 0 – 4,0%; B – 0 – 6,0%; Zn – 0 – 42,1%; Mn – 0 – 3,5%; екстракт морських водоростей Ecklonia maxima – 0 – 100%; гліцин-бетаїн – 0 – 5%; вільні амінокислоти рослинного походження – 0 – 10,5%, ауксини-еквівалент – 11 мг/л; цитокініни-еквівалент – 0,03 мг/л) КОМПО ЕКСПЕРТ ГмбХ, Німеччина	20 мл/кг	Кукурудза, соя, соняшник, пшениця	Обробка насіння	1
		3 – 30 мл/100 м ²	Кукурудза, соя, соняшник, пшениця, яблуня	Позакореневе підживлення	3 – 5
19.	UNITEQ, р. (N – 35%, P ₂ O ₅ – 35%, K ₂ O – 35%, SO ₃ – 25%, CaO – 14%, MgO – 16,6%, B – 15%, Fe – 10%, Mn – 10%, Cu – 10%, Zn – 40 %, Mo – 5 %, Co – 0,01%, SiO ₂ – 2%, органічні кислоти – до 30%, ПАР (поверхнево активні речовини, прилипаті та речовини які зменшують поверхневий натяг) – до 10%, фітогормони – до 0,5%) ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА», Україна	10 – 100 мл/100 м ²	Зернові, технічні, овочеві, плодово-ягідні культури	Кореневе підживлення	3 – 4
		5 – 20 мл/100 м ²		Позакореневе підживлення	
20.	AMİBOOST, РК (марки: СТАРТ, РОЗВИТОК, АНТИСТРЕС, БАЛАНС, ВРОЖАЙ) (N – 3 – 6%, P ₂ O ₅ – 2 – 5%, K ₂ O – 1,5 – 4,0%, MgO – 0 – 2,3%, амінокислоти – 9 – 30%) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	Марка ВРОЖАЙ			
		5 – 20 мл/100 м ²	Технічні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка АНТИСТРЕС			
		5 – 20 мл/100 м ²	Зернові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка БАЛАНС			
		5 – 30 мл/100 м ²	Ягідні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
		Марка РОЗВИТОК			
		5 – 30 мл/100 м ²	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3
	Марка СТАРТ				
		5 – 30 мл/100 м ²	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
21.	BEOZ LQ, p. (марки: ADAMITE, GARNET, GOLDSTONE, MOONSTONE) (N – 2,2 – 7,5%, K ₂ O – 2,07 – 3,5%, SO ₃ – 0,68 – 0,92%, Zn – 0,43 – 0,58%, Mn – 0,85 – 1,15%, Cu – 0,09 – 0,12%, B – 0,04 – 0,06%, Mo – 0,09 – 0,12%, C – 8,8 – 26,9%, амінокислоти, екстракт морських водоростей, фульвокислоти) ICL Europe Coöperatief U.A., Нідерланди	5 – 50 мл/100 м ²	Зернові культури (кукурудза)	Позакореневе підживлення	1 – 6
		10 – 50 мл/100 м ²	Овочеві культури (томати)	Фертигація	1 – 6
22.	BEOZ WS, п. (марки: Nephrite, Coral) (N – 0,85 – 4,18%, P ₂ O ₅ – 5,58 – 6,42%, K ₂ O – 3,6 – 18,9%, MgO – 0,85 – 3,3%, SO ₃ – 1,17 – 2,6%, Zn – 0,21 – 6,42%, B – 0,42 – 0,57%, Mo – 9,3 – 10,7%, Ni – 1,35 – 1,65%, Co – 0,42 – 0,58%, Se – 0,21 – 0,28%, C – 17,1 – 18,9%) ICL Europe Coöperatief U.A., Нідерланди	3 – 10 г/100 м ²	Зернобобові культури (соє)	Позакореневе підживлення	1 – 2
23.	ЗЕРИВА, KE (марки: РизоГумат, Ризо-Бор-Молібден, Арія, Віасил, Біолон) (солі гумінових і фульвових кислот – 0 – 75%; N – 0 – 5%; P ₂ O ₅ – 0 – 5%; K ₂ O – 0 – 5%; B – 0 – 15%; SO ₃ – 0 – 2%; MgO – 0 – 1%; CaO – 0 – 2%; Fe – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 1%; Mn – 0 – 10,6%; Zn – 0 – 1,2%; Cu – 0 – 0,7%; Co – 0 – 0,53%; SiO ₂ – 0 – 0,2%; органічні кислоти – 0 – 3%; амінокислоти – 0 – 2%; L- амінокислоти – 0 – 10%; ГіФ кислоти – 0 – 11%; фітогормони – 0 – 0,5%; витяжки ялицевої хвої – 0 – 1%; крезацин – 0 – 0,5%) ТОВ «ЗЕРИВА», Україна	10 мл/10 кг	Соє	Обробка насіння	1
		5 мл/100 м ²	Соє	Позакореневе підживлення	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
24.	Luronchem, п. (марки: 20-20-20+TE, 10-10-40+TE, 13-40-13+TE, 12-11-18+TE) (N – 10,0 – 20,0%; P ₂ O ₅ – 10,0 – 40,0%; K ₂ O – 13,0 – 40,0%; SO ₃ – 0 – 32,0%; Zn – 0,05%; B – 0,2%; Mn – 0,05%; Mo – 0,005%) ТОВ «Укрзовнішхімпром», Україна	Марка 20-20-20+TE			
		20 – 40 г/100 м ²	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		40 – 60 г/100 м ²		Фертигація	1 – 4
		Марка 13-40-13+TE			
		15 – 30 г/100 м ²	Овочеві культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		20 – 30 г/100 м ²		Фертигація	1 – 4
		Марка 10-10-40+TE			
		15 – 30 г/100 м ²	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 4
		Марка 12-11-18+TE			
20 – 40 г/100 м ²	Плодові культури	Позакореневе підживлення	1 – 4		
25.	Добриво на основі гумату калію «LEAF FORTE», р. (марки: «Гумат Форте», «Гумат Лист», «Гумат Грунт», «Гумат Бор») (N – 3,0 – 5,0%; P ₂ O ₅ – 10,0%; K ₂ O – 5,0 – 7,0%; MgO – 2,0 – 2,6%; SO ₃ – 1,0 – 3,6%; B – 0,02 – 11,0%; Fe – 0,01 – 0,2%; Cu – 0,01 – 0,41%; Mn – 0,03 – 0,3%; Zn – 0,01 – 0,48%; Mo – 0,001 – 0,05%; Co – 0,005 – 0,06%; гумінові кислоти – 1,0 – 1,5%) ТОВ «НБК «Ліст Форте», Україна	Марка «Гумат Форте»			
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		Марка «Гумат Лист»			
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		Марка «Гумат Грунт»			
		20 – 100 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Внесення під передпосівну культивуацію	1
		15 – 25 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		Марка «Гумат Бор»			
		5 – 15 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	1 – 3
		10 – 15 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
26.	Добриво «LEAF FORTE», р. (марки: «Універсальне», «Комплексне», «Спеціальне», «Макродобриво», «Монохелатне») (N – 0 – 40,5%, P ₂ O ₅ – 0 – 50,0%, K ₂ O – 0 – 36,0%, MgO – 0 – 8,5%, SO ₃ – 0 – 20,0%, B – 0 – 140,0 г/л, Fe – 0 – 35,0 г/л, Cu – 0 – 80,0 г/л, Mn – 0 – 55,0 г/л, Zn – 0 – 110,0 г/л, Mo – 0 – 37,0 г/л, Co – 0 – 50,0 г/л, гумінові кислоти – 3,0 – 6,0 г/л) ТОВ «НБК «Ліст Форте», Україна	<i>Марка «Універсальне»</i>			
		10 – 30 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		200 – 400 мл/ 100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Комплексне»</i>			
		10 – 30 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		200 – 400 мл/ 100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Спеціальне»</i>			
		5 – 30 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		200 – 400 мл/ 100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
		<i>Марка «Макродобриво»</i>			
		10 – 40 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		200 – 400 мл/ 100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
27.	Добриво рідке азотне із сіркою (КАС+S), р. (N – 24,5%, S – 3,4%) ТОВ «УТК Хімальянс», Україна	<i>Марка «Монохелатне»</i>			
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	3
		50 – 100 мл/ 100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	3
27.	Добриво рідке азотне із сіркою (КАС+S), р. (N – 24,5%, S – 3,4%) ТОВ «УТК Хімальянс», Україна	1,0 – 1,5 л/100 м ²	Зернові колосові культури	Основне внесення	1
		0,3 – 0,5 л/100 м ²	Зернові колосові культури	Позакореневе підживлення	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
28.	Біогловіт, р. (марки: Універсальне, Азот, NPK, Цинк, Бор Плюс, Калій), р. (N – 0 – 400,0 г/л, P ₂ O ₅ – 0 – 500,0 г/л, K ₂ O – 0 – 360,0 г/л, Mn – 0 – 1,5 г/л, Zn – 0 – 110,0 г/л, Cu – 0 – 1,5 г/л, Co – 0 – 0,2 г/л, Fe – 0 – 5,0 г/л, Mo – 0 – 0,25 г/л, B – 0 – 140,0 г/л, MgO – 0 – 43,0 г/л, CaO – 0 – 40,0 г/л, SO ₃ – 0 – 8,5 г/л, гумінові кислоти – 10,0 – 30,0 г/л) ФО-П Луценко А.А., Україна	<i>Марка «Універсальне»</i>			
		10 – 40 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		10 – 80 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		<i>Марка «Азот»</i>			
		10 – 50 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		10 – 80 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		<i>Марка «NPK»</i>			
		10 – 25 мл/100 м ²	Зернові, зернові колосові, зернобобові, олійні, овочеві культури, картопля	Позакореневе підживлення	5
		10 – 80 мл/100 м ²	Зернові, олійні, овочеві культури, картопля	Кореневе підживлення	5
		<i>Марки «Цинк», «Бор плюс» та «Калій»</i>			
29.	Бест, п. (марки: Тріко, Ризо) (K ₂ O – 7,0 – 7,5%, гумінові кислоти – 45,0 – 55,0%, фульвокислоти – 5,0 – 20,0%, <i>Bacillus subtilis</i> IAB/BSF1 – 0 – 1*10 ⁷ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> IABTH01 – 0 – 2*10 ⁷ КУО/г) Квімікас Мерістем (Químicas Meristem, S.L.), Іспанія	2 – 10 г/100 м ²	Овочеві культури	Кореневе підживлення з інтервалом між обробками 7 – 10 днів	2 – 3
		2 – 10 г/100 м ²	Плодові культури	Кореневе підживлення з інтервалом між обробками 15 – 20 днів	2 – 3
		2 – 10 г/100 м ²	Ягідні культури	Кореневе підживлення з інтервалом між обробками 10 – 15 днів	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
30.	ГуміСил (GumiSil), р. (марки: Моно-Мідь, Моно-Молибден, N) (N – 3,0 – 20,0%, Cu – 0 – 2,0%, Mo – 0 – 10,0%, гумінові кислоти – 5 – 10 г/л) ТОВ «Агропромисловий центр-Гарант», Україна	<i>Марки ГуміСил Моно-Молибден та ГуміСил Моно-Мідь</i>			
		10 – 15 мл/100 м²	Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	3
		20 – 25 мл/100 м²		Кореневе підживлення	3
		<i>Марка ГуміСил N</i>			
		30 – 40 мл/100 м²	Зернові колосові та зернові, зернобобові, олійні, овочеві культури	Позакореневе підживлення	3
40 – 60 мл/100 м²	Кореневе підживлення	3			
31.	Лідер Пульс Енерджі, р. (N – 28 г/л, P ₂ O ₅ – 56,34 г/л, K ₂ O – 79,7 г/л, Mg – 0,444 г/л, Cu – 0,246 г/л, S – 1,2 г/л, Mn – 0,368 г/л, Fe – 0,0966 г/л, Zn – 0,368 г/л, Mo – 0,035 г/л, Co – 0,0377 г/л, B – 0,315 г/л, гетероауксин (β-індолилцетова кислота) – 1,5 г/л, нафтилоцетова кислота – 1,5 г/л, бурштинова кислота – 6 г/л, саліцилова кислота – 6 г/л, аспарагінова кислота – 6 г/л, суміш натрієвих солей: 2-нітрофенолу – 0,68 г/л, 4-нітрофенолу – 0,68 г/л, 2,4-динітрофенолу – 0,68 г/л, гумат калію – 60 г/л, N-окис 2,6 диметилпіридину – 0,2–0,3 г/л, амінокислоти – 15,12 г/л, гіберелові кислоти – 1,2 г/л, екстракт морських водоростей – 60 г/л, силікат натрію – 20 г/л, поліетиленгліколь (ПЕГ-400) – 100 г/л, поліетиленгліколь (ПЕГ-1500) – 100 г/л, 20% ізопропанольний розчин біологічних речовин продуктів метаболізму ендогенних грибів – 50 г/л) ТОВ «НВП «Агротехнології», Україна	5 – 20 мл/100 м²	Зернові, зернобобові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
32.	Аскофілд, р. (марки: Органік (CS1), Плюс (CS2)) (N – 0,1 – 2,0%; P – 0,1 – 2,0%; K – 0,5 – 2,0%; S – 1500,0 – 3000,0 ppm; Zn – 0,1 ppm; B – 2,0 – 10,0 ppm; Mg – 650,0 – 1000,0 ppm; Ca – 600,0 – 1000,0 ppm; Fe – 100,0 ppm; Cu – 0,5 – 6,0 ppm; Mn – 3,0 – 5,0 ppm; Mo – 0,1 ppm; амінокислоти – 0,1 г/100 мл; альгінова кислота – 8,0 – 10,0 г/100 мл; фукоїдан – 2,0 г/100 мл; ламінарин – 2,0 г /100 мл; манітол – 2,0 г/100 мл; цитокініни – 15,0 – 20,0 мг/100 мл; гібереліни – 5,0 – 10,0 мг/100 мл; ауксини – 15,0 – 20,0 мг/100 мл; бетаїн – 50,0 – 70,0 ppm; брасиностероїди – 0,2–0,5 мг/100 мл; абсцизова кислота – 9,0–12,0 мг/100 мл; стріголактони – 1,5–2,0 мг/100 мл; органічна речовина – 4,0%) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	10 – 20 мл/100 м ²	Овочеві культури	Кореневе та позакореневе підживлення (перший обробіток через 2 – 3 тижні після появи сходів)	1 – 3
		10 – 20 мл/100 м ²	Зернові, олійні, технічні культури	Кореневе та позакореневе підживлення (у стадіях 2 – 5 листків)	2 – 3
		5 мл/100 м ²	Плодово-ягідні культури	Кореневе та позакореневе підживлення (від фази зеленого суцвіття до зав'язування плодів)	2 – 4
33.	СТАНДАРТ NPK, кр. (марки: N, P, K, B, ME) (N – 0 – 45%; P ₂ O ₅ – 0 – 45%; K ₂ O – 0 – 50%; S – 0 – 30%; Mg – 0 – 5%, Cu – 0 – 0,05%; Zn – 0 – 0,1%; Mn – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 0,005%; Fe – 0 – 20%, B – 0 – 21%, Ca – 0 – 35%) ТОВ-фірма «Агрохімпарк», Україна	0,9 – 1,35 кг/100 м ²	Зернові культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		10 – 60 г/100 м ²		Позакореневе підживлення (концентрація розчинів 0,3 – 3,0%)	3
		0,9 – 1,8 кг/100 м ²	Технічні культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,6 – 1,2 кг/100 м ²	Овочеві культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		10 – 60 г/100 м ²		Позакореневе підживлення (концентрація розчинів 0,3 – 3,0%)	4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		10 – 400 г/100 м ²		Фертигація (концентрація розчинів 0,005 – 0,3%)	4
		0,2 – 6,0 кг/100 м ² /200 л води		Кореневе підживлення	4
		30 г/м ²	Декоративні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,2 – 6,0 кг/100 м ² /200 л води		Кореневе підживлення	3
		0,01 – 0,2 кг/100 м ² /5 л води		Позакореневе підживлення	3 – 4
		30 г/м ²	Газонна трава	Кореневе підживлення	3 – 4
		0,2 – 0,6 кг/100 м ² /200 л води			
		25 г/м ² /5 л води	Квіткові рослини	Кореневе підживлення	3 – 4
		30 г/дерево	Хвойні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4
34.	СТАНДАРТ NPK, гр. (марки: N, P, K, S, ME) (N – 0 – 45%; P ₂ O ₅ – 0 – 45%; K ₂ O – 0 – 50%; S – 0 – 10%; Mg – 0 – 5%, Cu – 0 – 0,05%; Zn – 0 – 0,1%; Mn – 0 – 0,1%; Mo – 0 – 0,005%) ТОВ-фірма «Агрохімпарк», Україна	0,9 – 1,35 кг/100 м ²	Зернові культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,9 – 1,8 кг/100 м ²	Технічні культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		0,6 – 1,2 кг/100 м ²	Овочеві культури	Під основний обробіток ґрунту, передпосівну культивуацію та підживлення в період вегетації	3 – 4
		30 г/м ²	Декоративні культури, газонна трава	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		25 г/м ²	Квіткові рослини	Підживлення в період вегетації	3 – 4
		30 г/дерево	Хвойні культури	Підживлення в період вегетації	3 – 4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
35.	БіоСпліто, р. (гумат калію – 1%, суміш ензимів – не менше 18,8%) ЗАТ «Нандо», Литва	10 – 20 мл/100 м ²	Зернові колосові культури	Основне внесення в ґрунт, обприскування соломки та післяживних решток	1
36.	KSC ФІТ-актіл, гр. (марки: KSC I ФІТ-актіл, KSC II ФІТ-актіл, KSC III ФІТ-актіл, KSC V ФІТ-актіл, KSC VII Перла ФІТ-актіл, KSC Мікс ФІТ-актіл) (N – 0 – 23%, P ₂ O ₅ – 0 – 40%, K ₂ O – 0 – 42%, SO ₃ – 0 – 29%, MgO – 0 – 15%, CaO – 0 – 20%, B – 0 – 0,5%, Cu – 0 – 0,5%, Fe – 0 – 2,5%, Mn – 0 – 2%, Mo – 0 – 0,2%, екстракт морських водоростей – 0,7%) Тімак Агро Україна, Україна	20 – 500 г/100 м ²	Овочеві культури закритого та відкритого ґрунту, плодіві культури	Крапельне зрошування	2 – 15
37.	Бріо S, р. (N – 15%, SO ₃ – 33%, екстракт морських водоростей – 7,8%, екстракт рослин – 18,3%) Тімак Агро Україна, Україна	150 – 300 мл/100 м ²	Ріпак	Кореневе підживлення	1 – 3
		100 – 300 мл/100 м ²	Зернові культури		
38.	Фертіактіл GZ, р. (N – 13%, K ₂ O – 5%, гумінова кислота – 11,6%, екстракт рослин – 1,3%) Тімак Агро Україна, Україна	50 мл/100 м ²	Овочеві культури відкритого та закритого ґрунту	Кореневе підживлення, крапельне зрошування упродовж вегетації з інтервалом 14 дів	2 – 7
		30 – 100 мл/100 м ²	Технічні культури		1 – 2
		20 – 30 мл/100 м ²	Зернові культури		1
39.	ЗЕО, р. (марки: ЗЕОСАН, ЗЕОЗЕРНО) (SO ₃ – 0 – 14%, CaO – 10%, B – 0 – 4%, Mo – 0 – 0,4%, MgO – 0 – 7%, SiO ₂ – 10%, екстракт рослин – 6,5 – 7%) Фертілайн, Франція	25 – 50 мл/100 м ²	Зернові, олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		25 мл/100 м ²	Технічні культури		2
40.	БОРО, р. (марки: БОРОЛАЙН, БОРОМОЛАЙН) (B – 8 – 11%, Mo – 0 – 0,6%) Фертілайн, Франція	5 – 20 мл/100 м ²	Зернові культури	Позакореневе підживлення	1
		20 мл/100 м ²	Зернобобові культури		
		30 мл/100 м ²	Олійні, технічні, кормові культури, картопля		
41.	Бороніафос, р. (P ₂ O ₅ – 6,7 – 7,7%, B – 7,9 – 8,9%) Агронутрісін, Франція	20 мл/100 м ²	Олійні культури	Позакореневе підживлення	1 – 2
		20 – 30 мл/100 м ²	Технічні культури, картопля		
		20 мл/100 м ²	Соя		1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
42.	Екоплант-Гумі, гр. (K ₂ O – 25%, P ₂ O ₅ – 2%, CaO – 10%, MgO – 8%, S – 4%, Bo – 0,05 – 0,27%, Zn – 0,03%, Mn – 0,018%, гумінові речовини – 4 – 7%) ТОВ «ОРІЙ», Україна	2,0 кг/100 м ²	Ячмень ярий	Основне внесення або під культивуацію	1
		3,0 кг/100 м ²	Кукурудза, соняшник, соя	Основне внесення або під культивуацію	1
43.	«Українські Гумати», Р. (N – не менше 0,1%, K ₂ O – не менша 0,2%, Cu – 0,8%, Zn – 6,10%, Mn – 5,74%, гумінові речовини в перерахунку на гумінові кислоти – не менше 3,0%) ФОП Голубокий В.Ф., Україна	0,2 л/т	Картопля	Обробка бульб	1
		0,2 мл/кг	Овочеві культури	Обробка насіння	1
		1,5 мл/100 м ²	Овочеві, плодові культури, картопля	Позакореневе підживлення	2 – 4
44.	ОРГАНІЦЯ Мікс, п. («Infinity», «Інокула», «Mega Harvest/Combo», «Азотікс», «Метабо/Почво») (N – 0 – 20%; P ₂ O ₅ – 0 – 20%; K ₂ O – 0 – 20%; S – 0 – 15%; Ca – 0 – 15%; B – 0 – 15%; Zn – 0 – 15%; Fe – 0 – 15%; Co – 0 – 5%; Cu – 0 – 10%; Mn – 0 – 15%; Mg – 0 – 15%; Mo – 0 – 15%; Si – 0 – 15%; гумат калію 0 – 20%; органічні речовини 0,1 – 80%; органічні кислоти – 0 – 20%; амінокислоти 0 – 20%; комплекс мікроорганізмів (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> <i>БТА 014</i> , <i>Trichoderma viride</i> <i>БТА 004</i> , <i>Trichoderma</i> <i>harzianum</i> <i>БТА 015</i> , <i>Rhizobium leguminosarum</i> <i>БТА 012</i> , <i>Bradyrhizobium japonicum</i> <i>БТА 001</i> , <i>Bradyrhizobium</i> <i>japonicum</i> <i>БТА 010</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>BD 18002</i> , <i>Azospirillum brasilense</i> <i>БТА 013</i> , <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>БТА 008</i> , <i>Bacillus megaterium</i> <i>БТА 007</i> , <i>Bacillus</i> <i>licheniformis</i> <i>BD 18101</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> <i>БТА</i> <i>019</i> , <i>Coniothyrium minitans</i> <i>БТА 016</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>БТА 002</i> , <i>Beauveria bassiana</i> <i>БТА 005</i> , <i>Metarhizium</i> <i>anisopliae</i> <i>БТА 008</i> , <i>Pseudomonas putida</i> <i>БТА 020</i> , <i>Arthrobotrys oligospora</i> <i>БТА 017</i> , <i>Purpureocillium</i> <i>lilacinum</i> <i>БТА 018</i> , <i>Rhizobium phaseoli</i> <i>БТА 011</i> , <i>Streptomyces avermitilis</i> <i>БТА 003</i>) – титр – не менше 1*10 ⁷ КУО/г) ПП «Біотех Актив», Україна	<i>Марка «Infinity»</i>			
		10 – 30 г/100 м ²	Соняшник	Позакореневе підживлення	5
		<i>Марка «Інокула»</i>			
		1 – 10 г/кг	Ріпак ярий	Обробка насіння	1
		<i>Марка «Mega Harvest/Combo»</i>			
		10 – 30 г/100 м ²	Соняшник	Позакореневе підживлення	5
		<i>Марка «Азотікс»</i>			
		1 – 10 г/кг	Соя, горох, квасоля	Обробка насіння	1
		<i>Марка «Метабо/Почво»</i>			
		10 – 30 г/100 м ²	Кукурудза	Прикореневе внесення	5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Регулятори росту рослин

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м ² , мл/100 м ² , г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Штепіват, РК (мепікват-хлорид, 250 г/л) ТОВ «Штефес», Україна	0,6 – 1,2 л/га	Ріпак озимий	Оптимальне застосування восени – в фазу трьох-семи листіків (ВВСН 13-17). Весняне застосування від фази початку стеблування (ВВСН 31-32) до фази середини бутонізації (до ВВСН 55). Запобігання переростанню культури, покращення перезимівлі та проти вилягання	2
2.	Молвіт, КЕ (тринексапак-етил, 250 г/л) ТОВ «Укравіт Сайенс Парк», Україна; ТОВ «УКРАВІТ АГРО», Україна	0,4 – 0,8 л/га	Зернові колосові культури (озимі, ярі)	Обприскування в період вегетації (ВВСН 21-37). Інгібування росту рослин	2
3.	*Трінетил, КЕ (тринексапак-етил 250 г/л) ТОВ «Група компаній «ВІТАГРО», Україна	0,4 – 0,6 л/га	Пшениця озима	Обприскування в період вегетації	2
		0,4 – 0,6 л/га	Ячмінь озимий	Обприскування в період вегетації	2
		0,4 – 0,6 л/га	Ячмінь ярий	Обприскування в період вегетації	2
		0,4 – 0,8 л/га	Ріпак озимий	Обприскування в період вегетації	2
4.	*Мелізол Гроу, РК (етефон, 660 г/л) ТОВ «Група компаній «ВІТАГРО», Україна	0,3 – 0,5 л/га	Ячмінь ярий	Обприскування в період від початку трубкування до появи прапорцевого листка	2
		0,3 – 0,5 л/га	Ячмінь озимий	Обприскування в період від початку трубкування до появи прапорцевого листка	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		0,4 – 0,75 л/га	Соняшник	Обприскування в період від фази початку видовження стебла до фази утворення зірочки	1
5.	Arginex Soy, р. (L-аргінін-фосфат – 6 – 10%) Arevo AB, Швеція	4 г/кг	Зернобобові культури	Обробка насіння	1
6.	C-Bio Grow, р. (Ascophyllum nodosum 10,04%) C&B AGRI ENTERPRISES Ltd, Ірландія	0,75 – 1,0 л/га 1,0 – 2,0 л/га	Зернові (пшениця, ячмінь), зернобобові (соя, горох) культури	Обприскування в період вегетації Фертигація	1 – 2
7.	Вимпел-К, р. (загальний вміст поліетіленгліколей (ПЕГ-400; ПЕГ-1500) – 770 г/л, гумінові кислоти – 3 г/л, бурштинова кислота – 3 г/л) МП НДП «Долина», Україна	2 – 3% розчин	Озимі та ярі колосові культури (пшениця озима, ячмінь ярий)	Обробка насіння	1
8.	Вимпел 2, р. (багатоатомні спирти – 300 г/л; гумінові кислоти – 30 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0 г/л) МП НДП «Долина», Україна	0,5 – 1,0 л/га	Зернові колосові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 3
9.	Вимпел К2, р. (трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою – 3 г/л; багатоатомні спирти – 300 г/л; гумінові кислоти – 60 г/л; карбонові кислоти природного походження – 6,0 г/л) МП НДП «Долина», Україна	0,5 – 1,0 л/т	Зернові колосові культури	Обробка насіння	1
10.	Пасліній, р. (солі аміноспиртів із заміщеними феноксіоцетових кислот – 52–58г/л) МП НДП «Долина», Україна	0,05 – 0,2 л/га	Пасльонові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 4
11.	Грейнактив-С, ВР (полігексаметилгуанідин гідрохлорид, 18,6 г/л + полігексаметилгуанідин фосфат, 1,4 г/л) ПП «ФІАНІС-Т», Україна	1,0 л/т 0,1 л/т	Буряки цукрові, ріпак ярий Пшениця, ячмінь ярий, рис	Обробка насіння Обробка насіння	1 1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
12.	Вівео, РК (форхлорфенурон, 10 г/л) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	0,5 – 1,0 л/га	Яблуня	Обприскування у фазі, коли розмір зав'язі плоду 8 – 12 мм	1 – 2
		0,5 – 1,0 л/га	Груша	Обприскування в період між 15 та 25 днем після моменту опадання пелюсток	1 – 2
		0,5 – 1,0 л/га	Черешня	Обприскування від фази опадання пелюсток до початку зміни забарвлення плодів на солом'яний колір	1 – 2
		0,5 – 1,0 л/га	Лохина	Обприскування від фази опадання пелюсток до початку росту ягід, друге використання через 14 днів після першої обробки	1 – 2
13.	Ексіліс, РК (6-бензиладенін, 20 г/л) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	3,75 – 7,5 л/га	Яблуня	Обприскування рослин у фазу досягнення центральним плодом 8 – 16 мм в діаметрі	1
		5,0 – 7,5 л/га	Груша		
14.	Новагіб, РК (гібереліни GA 4/7, 10 г/л) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	0,25 – 0,5 л/га	Яблуня	Обприскування рослин від стадії початку цвітіння і до стадії опадання пелюсток, з трьома подальшими застосуваннями з інтервалами 7 – 10 діб	4
15.	Рефайн, РК (1-нафтилоцтової кислоти калійна сіль, 242 г/л) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	30 – 60 мг/га	Яблуня	Обприскування в період вегетації (стадія розміру плодів 5 – 10 мм)	1
		60 мл/га	Яблуня	Обприскування в період вегетації (стадія розвитку 7 – 14 днів до збирання врожаю)	1 – 2
		30 – 45 мл/га	Груша	Обприскування в період вегетації (стадія розвитку 15 – 28 день після повного цвітіння)	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		60 мл/га	Груша	Обприскування в період вегетації (стадія розвитку 7 – 14 днів до збирання врожаю)	1 – 2
16.	Флоргіб, ТБ (гібберелінова кислота (GA3) – 200 г/кг) Файн Агрокемікалс Лтд., Великобританія	2 – 6 табл. / 100 л води	Груша	Обприскування в період вегетації (у фазу цвітіння)	1 – 2
		1 – 3 табл. / 100 л води	Виноград	Обприскування в період вегетації (до моменту повного цвітіння)	1 – 2
		1 – 2 табл. / 100 л води	Черешня	Обприскування в період вегетації (за три тижні до збору урожаю)	1 – 2
		1 – 3 табл. / 100 л води	Суніця садова	Обприскування в період вегетації (у фазу цвітіння)	1 – 2
17.	Регоплант, в.с.р. (регулятор росту рослин «Радостим», що містить діючі речовини регулятора росту рослин Емістим С – 0,3 г/л; калієву сіль альфа-нафтилоцтової кислоти – 1,0 мг/л; комплекс біогенних мікроелементів B ³⁺ , Cu ²⁺ , Mn ²⁺ , Zn ²⁺ , Co ²⁺ , Fe ²⁺ , J ⁻ , Mo ⁶⁺ – загальна концентрація 1,75 г/л; лікарський засіб «Діамантовий зелений» – 0,01 г/л) + Аверсектин С – природний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авермектинів, – 0,01 г/л) ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України, Україна	0,25 л/т	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		0,05 л/га	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обприскування в період вегетації	1
		0,05 л/га	Овочеві, ягідні (полуниця) культури	Обприскування в період вегетації	2 – 3
18.	Стимпо, в.с.р. (модифікована діюча речовина регулятора росту рослин Емістиму С – 1,0 г/л, комплекс біогенних мікроелементів – 0,014 г/л + Аверсектин С – природний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авермектинів, – 0,01 г/л) ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України, Україна	0,025 л/т	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		0,02 л/га	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обприскування в період вегетації	1
		0,025 л/га	Овочеві, ягідні (полуниця) культури	Обприскування в період вегетації	2 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
19.	Гарденантистрес, РК (L-лізин моногідрохлорид, 20 г/л) ФО-П Луценко А.А., Україна	1,0 л/га	Садіві та плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	5
		1,0 – 1,5 л/га	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	2
		1,0 – 1,5 л/га	Овочеві культури, квіти	Обприскування в період вегетації	3
20.	Статус (Status), в.р. (1-(2-метоксиетил)-3-(1,2,3-тіадіазол-5-іл) сечовина – 2 г/л, підолова кислота – 320 г/л) IntraCrop a division of Frontier Agriculture Limited, Великобританія	0,2 – 0,5 л/га	Пшениця яра, ячмінь ярий, кукурудза	Обприскування в період вегетації (у фазах розвитку рослин BBCH 13-59)	1 – 2
		0,2 – 0,5 л/га	Ріпак ярий	Обприскування в період вегетації (у фазах розвитку рослин BBCH 13-59)	1 – 2
		0,2 – 0,5 л/га	Соняшник	Обприскування в період вегетації (у фазах розвитку рослин BBCH 13 – 18)	1 – 2
21.	Меквалан 750, РК (хлормекват хлорид 750 г/л) ТОВ «Агрофлекс», Україна	0,75 – 2,0 л/га	Пшениця озима, ячмінь	Обприскування посівів від початку кушіння до початку виходу в трубку культури	2
		1,0 – 2,0 л/га	Озимий ріпак	Обприскування в фазі 2 – 4 листків	1
22.	Келпак, РК (ауксини 11 мг/л, цитокініни 0,03 мг/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	2,0 – 3,0 л/т	Зернові колосові (пшениця озима, ячмінь ярий)	Обробка насіння	1
		2,0 л/га		Внесення восени в фазі 3 – 5 листків в випадку відставання в рості. Внесення навесні від фази кушіння до виходу в трубку.	2
		2,0 л/га	Ріпак	Внесення до бутонізації. Восени фаза утворення листків та розетки, навесні фаза стеблуння	2
		3,0 – 5,0 л/т	Кукурудза	Передпосівна обробка насіння	1
		2,0 л/га		Внесення в фазі 3 – 5 листків, друге внесення від фази 8 – 10 листків до викидання волоті	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
		3,0 – 5,0 л/т	Соняшник	Передпосівна обробка насіння	1
		2,0 л/га		Внесення в фазі 4 – 6 листків, друге внесення через 14 діб після першого внесення	2
		2,0 – 4,0 л/га	Овочеві культури	Внесення в фазі 3 – 4 листків, друге внесення через 14 діб	2
		2,0 – 4,0 л/га	Картопля	Внесення через 14 – 28 днів після появи сходів (висота рослини до 15 см), друге внесення через 14 діб	2
		2,0 л/га	Буряки цукрові	Внесення в фазі 4 – 6 справжніх листків, друге від змикання листя в рядках до змикання міжрядь	2
		2,0 – 3,0 л/т	Горох	Передпосівна обробка насіння	1
		2,0 – 4,0 л/га		Внесення у фазу 3 – 5 листків, друге внесення через 14 діб до цвітіння	2
		3,0 – 5,0 л/т	Соя	Передпосівна обробка насіння	1
		2,0 – 4,0 л/га		Внесення у фазу 3 – 5 листків, друге внесення через 14 діб до цвітіння	2
		2,0 – 3,0 л/га	Яблуна, груша, слива, виноград	Обприскування в період вегетації від початку цвітіння до початку плодоношення. Повторні обробки з інтервалом 10 – 12 діб	2
23.	Елізон, СЕ (фітостироли, 5%) Елісіт Планта, Франція	0,5 – 1,0 л/га	Зернобобові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 3
24.	Фертіактіл SD, р. (В – 0,01%, Zn – 1,5%, Mn – 1,5%, гумінова кислота – 2,3%, екстракт рослин – 2,4%) Тімак Агро Україна, Україна	3,5 л/т	Зернові колосові культури	Обробка насіння	1
		10,0 – 15,0 л/т	Зернові культури		
		2,0 – 3,0 л/т	Зернобобові культури		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Регулятори росту рослин для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г/100 м ² , мл/100 м ² , г/кг, мл/кг)	Культура, об'єкт, що обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6
1.	Arginex Soy, р. (L-аргінін-фосфат – 6 – 10%) Arevo AB, Швеція	4 г/кг	Зернобобові культури	Обробка насіння	1
2.	Вимпел-К, р. загальний вміст поліетіленгліколей (ПЕГ-400; ПЕГ-1500) – 770 г/л, гумінові кислоти – 3 г/л, бурштинова кислота – 3 г/л) МП НДП «Долина», Україна	2 – 3% розчин	Озимі та ярі колосові культури (пшениця озима, ячмінь ярий)	Обробка насіння	1
3.	Вимпел 2, р. (багатоатомні спирти – 300 г/л; гумінові кислоти – 30 г/л; карбонові кислоти природного походження – 3,0 г/л) МП НДП «Долина», Україна	5 – 10 мл/100 м ²	Зернові колосові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 3
4.	Вимпел К2, р. (трифосфорний ефір похідних аденіну з рибозою – 3 г/л; багатоатомні спирти – 300 г/л; гумінові кислоти – 60 г/л; карбонові кислоти природного походження – 6,0 г/л) МП НДП «Долина», Україна	5 – 10 мл/кг	Зернові колосові культури	Обробка насіння	1
5.	Пасліній, р. (солі аміноспиртів із заміщеними феноксіоцетових кислот – 52–58г/л) МП НДП «Долина», Україна	0,5 – 2 мл/100 м ²	Пасльонові культури	Обприскування в період вегетації	1 – 4



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
6.	Регоплант, в.с.р. (регулятор росту рослин «Радостим», що містить діючі речовини регулятора росту рослин Емістим С – 0,3 г/л; калієву сіль альфа-нафтилоцтової кислоти – 1,0 мг/л; комплекс біогенних мікроелементів B^{3+} , Cu^{2+} , Mn^{2+} , Zn^{2+} , Co^{2+} , Fe^{2+} , J^- , Mo^{6+} – загальна концентрація 1,75 г/л; лікарський засіб «Діамантовий зелений» – 0,01 г/л) + Аверсектин С – природний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авермектинів, – 0,01 г/л) ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України, Україна	2,5 мл/ 100 мл води/ 10 кг насіння	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		0,5 мл/ 3 л води/100 м ²	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обприскування в період вегетації	1
		0,5 мл/ 3 л води/100 м ²	Овочеві, ягідні (полуниця) культури	Обприскування в період вегетації	2 – 3
7.	Стимпо, в.с.р. (модифікована діюча речовина регулятора росту рослин Емістиму С – 1,0 г/л, комплекс біогенних мікроелементів – 0,014 г/л + Аверсектин С – природний комплекс, що складається з 8 індивідуальних авермектинів, – 0,01 г/л) ДП «Міжвідомчий науково-технологічний центр «Агробіотех» НАН та МОН України, Україна	0,2 мл / 100 мл води/ 10 кг насіння	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обробка насіння	1
		0,2 мл/ 3 л води/100 м ²	Зернові колосові, зернобобові, технічні культури	Обприскування в період вегетації	1
		0,25 мл/ 3 л води/100 м ²	Овочеві, ягідні (полуниця) культури	Обприскування в період вегетації	2 – 3
8.	Гарденантистрес, РК (L-лізин моногідрохлорид, 20 г/л) ФО-П Луценко А.А., Україна	10 мл/100 м ²	Садові та плодово-ягідні культури	Обприскування в період вегетації	5
		5 – 10 мл/100 м ²	Зернові культури	Обприскування в період вегетації	2
		5 – 10 мл/100 м ²	Овочеві культури, квіти	Обприскування в період вегетації	3
9.	Фертіактіл SD, р. (В – 0,01%, Zn – 1,5%, Mn – 1,5%, гумінова кислота – 2,3%, екстракт рослин – 2,4%) Тімак Агро Україна, Україна	0,35 л/100 кг	Зернові колосові культури	Обробка насіння	1
		1 – 1,5 л/100 кг	Зернові культури		
		0,2 – 0,3 л /100 кг	Зернобобові культури		



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6
10.	Келпак, РК (ауксини 11 мг/л та цитокиніни 0,03 мг/л) ТОВ «ТерраВіта Україна», Україна	20,0 – 40,0 мл/ 100 м ² / 5 – 10 л води	Овочеві культури, в т.ч. картопля	Обприскування в період вегетації, друге внесення за 14 днів до цвітіння і до появи плодів	3
		20,0 – 30,0 мл/ 100 м ² / 5 – 10 л води	Яблуня, абрикос	Обприскування в період вегетації від початку цвітіння до початку плодоношення. Повторні обробки з інтервалом 10 – 12 днів	4
11.	Елізон, СЕ (фітостироли, 5%) Елісіт Планта, Франція	5 – 10 мл/100 м ²	Зернобобові культури	Позакореневе підживлення	1 – 3



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Біопрепарати

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	Састід FS, ТН (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (синонім <i>Bacillus subtilis</i>) strain QST 713, титр – 2,7*10 ¹⁰ КУО/г (88,59%)) Байєр АГ, Німеччина	2,0 – 6,0 л/т (залежно від маси тисячі насінин)	Соняшник	Фузаріоз, сіра гниль	Передпосівна обробка насіння	1
2.	ІНІТІА від Апхі.Біо™, КД (INITIA by Aphea.Bio™ DC) (<i>Penicillium bialowiezense</i> штам F2F8 – мін. 2*10 ⁹ КУО/мл (CFU/ml) Апхі.Біо НВ (Aphea.Bio NV), Бельгія	25 мл/ 50 тис. насінин	Кукурудза	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		400 – 1000 мл/ 100 кг насіння	Олійні культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		250 мл/ 100 кг насіння	Зернові колосові, зернобобові культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
		390 мл/ 100 кг насіння	Кормові культури	Підвищення врожайності та покращення якості продукції	Обробка насіння	1
3.	«MicoCell», ЗП (<i>Bacillus licheniformis</i> ІА 24, титр – 2,0*10 ⁹ КУО/г, <i>Paenibacillus polymyxa</i> ІА 24, титр – 2,0*10 ⁹ КУО/г, <i>Trichoderma harzianum</i> Т-22, титр – 5,0*10 ⁷ КУО/г) ТОВ «КОМПАНІЯ «ІМЕКС АГРО», Україна	0,5 – 1,0 кг/га	Післяжнивні рештки зернових (кукурудза) культур	Для прискорення та поліпшення розкладання післяжнивних решток	Обробка стерні та ґрунту після збирання культури	1 – 2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
4.	Бактоцид (рідка форма), в.с. (<i>Salmonella enteritidis</i> var. <i>Issatschenko</i> B-17X, титр – 2,0*10 ⁹ КУО/мл) ДУ «Волинська фітосанітарна випробувальна лабораторія Держпродспоживслужби», Україна	3 – 5 кг принади/га (1 л культуральної рідини на 10 кг зерна (пшениці, жита, ячменю, вівса, ін) з додаванням 25 мл олії)	Сільськогосподарськ і угіддя, складські приміщення (не призначені для зберігання харчових продуктів)	Мишоподібні гризуни	Розкладання (внесення) у місцях заселення гризунів безпосередньо в нори з послідуємим її засипанням, або на спеціальних контейнерах на шляху пересування	1
5.	BIOSIB N351, ЗП (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> N351, титр – 1*10 ⁹ КУО/г) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	2,0 – 3,0 кг/га	Соя	Кореневі гнилі (збудники роду <i>Fusarium</i> spp.), пліснявіння насіння, бактеріози	Обприскування рослин (з інтервалом між обробками 7 днів)	5
6.	BIONUTRIENTS SOLUBLE AG, п. (<i>Bacillus subtilis</i> SP 1 – 2,4 *10 ⁸ КУО/г, <i>Bacillus licheniformis</i> – 2,5*10 ⁷ КУО/г, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> USDA 110 – 1,24*10 ⁸ КУО/г, <i>Bacillus pumilus</i> GB 34 – 1,75*10 ⁸ КУО/г, дріжджі <i>Saccharomyces cerevisiae</i> – 2,0*10 ⁸ КУО/г, N – 8%, K ₂ O – 9%, гумінові кислоти – 15%, L-амінокислоти – 35,7%) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	2 кг/т	Зернові колосові культури	Стимулювання росту та розвитку культурних рослин, підвищення врожайності та якості продукції	Обробіток насіння	1
		0,75 кг/га	Зернові колосові культури		Позакореневе підживлення в фазі колосіння	
			Олійні культури		Позакореневе підживлення в фазі початку цвітіння	
			Зернові культури (кукурудза)		Позакореневе підживлення у фазі 4 – 5 листків	
		1 кг/га	Зернобобові культури		Позакореневе підживлення в фазі початку цвітіння	2
			Овочеві культури		Позакореневе підживлення в фазі початку цвітіння і утворення зав'язей	
		0,75 кг/га	Плодові культури		Кореневе підживлення після висадки розсади і утворення зав'язей	
					Позакореневе підживлення в фазі рожевого бутону і утворення зав'язей	



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
7.	Ельбустер, п. (<i>Bradyrhizobium japonicum</i> E109, <i>Bradyrhizobium diazoefficiens</i> USDA110, титр – $5 \cdot 10^9$ – $1 \cdot 10^{10}$ КУО/г) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	1,0 – 2,0 кг/т	Соя	Фіксація азоту. Стимулювання росту та розвитку культурних рослин, підвищення врожайності та якості продукції	Обробка насіння	1
8.	Ельбустер Комбі, п. (<i>Bradyrhizobium japonicum</i> E109, <i>Bradyrhizobium diazoefficiens</i> USDA110, титр – $1,0$ – $1,5 \cdot 10^9$ КУО/г) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	2,5 кг/т	Соя	Фіксація азоту. Стимулювання росту та розвитку культурних рослин, підвищення врожайності та якості продукції	Обробка насіння	1
9.	Імпульсаро, р. (<i>Bradyrhizobium japonicum</i> E109, <i>Bradyrhizobium diazoefficiens</i> USDA110, титр – $5 \cdot 10^9$ – $2 \cdot 10^{10}$ КУО/мл) Іфаґрі Лтд. (Ifagri Ltd.), Великобританія	2,0 л/т	Соя	Фіксація азоту. Стимулювання росту та розвитку культурних рослин, підвищення врожайності та якості продукції	Обробка насіння	1
10.	Біоларсе, р. (<i>Bacillus cereus</i> B-87, титр – $1 \cdot 10^7$ КУО/мл, N – 2%, P ₂ O ₅ – 0,5%, K ₂ O – 2,5%, C – 20%, органічна речовина – 34,5%) ПП «Земельний капітал», Україна	5,0 – 12,0 л/га	Технічні культури (у т.ч. буряки цукрові)	Підживлювальна дія	Позакореневий та кореневий обробіток	3
11.	Біоера Радісан ДС (Bioera Radisane DS), п. (<i>Bacillus velezensis</i> BM-2110, титр – $1,5 \cdot 10^8$ КУО/г; <i>Bacillus methylotrophicus</i> BM-13121, титр – $1,5 \cdot 10^8$ КУО/г; <i>Bacillus subtilis</i> BM-1102, титр – $2 \cdot 10^8$ КУО/г) ТОВ «Біогрін-ЮА», Україна	1,0 – 3,0 л/га	Овочеві, плодово-ягідні культури	Підживлювальна дія	Внесення з поливною водою (іригація) або обприскування водним розчином	1 – 2 рази на тиждень протягом періоду вегетації



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
12.	Родент Офф, р. (<i>Salmonella enteritidis</i> var. <i>Issatschenko</i> 537, титр – 1,0*10 ⁹ КУО/мл) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна; ПП «БТУ-Центр», Україна	1,5 – 2,5 кг/га на нірку готової приманки (0,5 – 2,0 л/ 10 кг зерна та рівномірно перемішати)	Сільсько- господарські угіддя, складські приміщення	Мишоподібні гризуни	Принади розкладають в норі в осінній, зимовий та ранньовесняний період з послідуємим їм засипанням або на спеціальних підложках у місцях локалізації гризунів	2
13.	РІЗОЛАЙН (RIZOLINE), КС (<i>Bradyrhizobium japonicum</i> 810-Л – 50±20%, <i>Rhizobium leguminosarum</i> 210-Л – 50±20%, загальне число життєздатних клітин – 2 – 6*10 ⁹ КУО/см ³ , вітаміни, гетероауксини, гібереліни) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна	1,0 – 3,0 л/т	Соя	Фіксація атмосферного азоту	Обробка насіння	1
14.	GROUNDFIX (ГРАУНДФІКС), КС (<i>Bacillus subtilis</i> 221, <i>Bacillus subtilis</i> FA/12Л (20 – 30%), <i>Bacillus megaterium</i> var. <i>phosphaticum</i> P/14Л (20 – 30%), <i>Azotobacter chroococcum</i> 3064 (15 – 20%), <i>Enterobacter</i> sp. 30 АФ-Л/13 (15 – 20%), <i>Raenibacillus polymyxa</i> 1718 (10 – 15%), загальне число життєздатних клітин – 0,5 – 1,5*10 ⁹ КУО/см ³) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна	5,0 – 12,0 л/га	Грунт перед дискуванням, оранкою, культивуацією, сівбою або висаджуванням сільсько- господарських культур	Покращення рихлості, вологоємності та повітряної проникності ґрунту, збільшення кількості корисної ґрунтової мікрофлори, зменшення кількості шкідливих мікроорганізмів	Внесення в ґрунт	1
		3,0 – 5,0 л/га	Грунт під час висіву насіння овочевих, зернових колосових культур, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, сої		Внесення в ґрунт	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
		3,0 – 7,0 л/га	Грунт безпосередньо перед висаджуванням розсади овочевих культур, саджанців (розсади) плодово-ягідних культур		Внесення в ґрунт	1
15.	Актоверм, КЕ (комплекс природних авермектинів аверсектин С, 0,2%, який продукується <i>Streptomyces avermitilis</i> 212Л) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна; ПП «БТУ-Центр», Україна	0,3 – 0,4 л/га	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	2
		2,0 л/га	Огірки в умовах закритого ґрунту	Павутинний кліщ	Обприскування в період вегетації	2

Біопрепарати для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7
1.	BIOSIB N351, ЗП (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> N351, титр – 1*10 ⁹ КУО/г) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	20 – 30 мл/ 100 м ²	Соя	Кореневі гнилі (збудники роду <i>Fusarium</i> spp.), пліснявіння насіння, бактеріози	Обприскування рослин (з інтервалом між обробками 7 днів)	5



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
2.	BIONUTRIENTS SOLUBLE AG, п. <i>(Bacillus subtilis</i> SP 1 – 2,4 *10 ⁸ КУО/г, <i>Bacillus licheniformis</i> – 2,5*10 ⁷ КУО/г, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> USDA 110 – 1,24*10 ⁸ КУО/г, <i>Bacillus pumilus</i> GB 34 – 1,75*10 ⁸ КУО/г, дріжджі <i>Saccharomyces cerevisiae</i> – 2,0*10 ⁸ КУО/г, N – 8%, K ₂ O – 9%, гумінові кислоти – 15%, L-амінокислоти – 35,7%) ТОВ «ІМІСК ІМПОРТ ЕКСПОРТ ТА ЛОГІСТИКА», Україна	5 – 25 г/100 м ²	Овочеві, плодово-ягідні культури	Підживлювальна дія	Внесення з поливною водою (іригація) або обприскування водним розчином	1 – 2 рази на тиждень протягом періоду вегетації
3.	РІЗОЛАЙН (RIZOLINE), КС <i>(Bradyrhizobium japonicum</i> 810-Л – 50±20%, <i>Rhizobium leguminosarum</i> 210-Л – 50±20%, загальне число життєздатних клітин – 2 – 6*10 ⁹ КУО/см ³ , вітаміни, гетероауксини, гібереліни) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна	1 мл/кг	Соя	Фіксація атмосферного азоту	Обробка насіння	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

1	2	3	4	5	6	7
4.	GROUNDFIX (ГРАУНДФІКС), КС <i>(Bacillus subtilis</i> 221, <i>Bacillus subtilis</i> FA/12Л (20 – 30%), <i>Bacillus megaterium</i> var. <i>phosphaticum</i> P/14Л (20 – 30%), <i>Azotobacter chroococcum</i> 3064 (15 – 20%), <i>Enterobacter</i> sp. 30 АФ-Л/13 (15 – 20%), <i>Paenibacillus polymyxa</i> 1718 (10 – 15%), загальне число життєздатних клітин – 0,5 – 1,5*10 ⁹ КУО/см ³) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна	30 – 50 мл/100 м ²	Грунт під час висіву насіння овочевих, зернових колосових культур, кукурудзи, соняшнику, ріпаку, сої	Покращення рихлості, вологості та повітряної проникності ґрунту, збільшення кількості корисної ґрунтової мікрофлори, зменшення кількості шкідливих мікроорганізмів	Внесення в ґрунт	1
		30 – 70 мл/100 м ²	Грунт безпосередньо перед висаджуванням розсади овочевих культур, саджанців (розсади) плодово-ягідних культур		Внесення в ґрунт	1
5.	Актоверм, КЕ (комплекс природних авермектинів аверсектин С, 0,2%, який продукується <i>Streptomyces avermitilis</i> 212Л) ТОВ «ТД «БТУ-Центр», Україна; ПП «БТУ-Центр», Україна	4 мл / 3 – 4 л води/100 м ²	Картопля	Колорадський жук	Обприскування в період вегетації	2
		20 мл / 10 л води/100 м ²	Огірки в умовах закритого ґрунту	Павутинний кліщ	Обприскування в період вегетації	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
 Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Нематоциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нематем (Nematem), ВР (екстракт чорнобривців Tagetes spp. – 60%, екстракт водоростей Ascophyllum nodosum – 5%, Fe EDTA – 0,4%, Mn EDTA – 0,2%, Zn EDTA – 0,2%) Квімікас Мерістем (Químicas Meristem, S.L.), Іспанія	10,0 – 15,0 л/га	Овочеві, плодові, ягідні культури	Галова нематода, мігруюча коренева нематода, яблунева галова нематода	Внесення у ґрунт	-	2 – 5 (з інтервалом 20 – 30 днів)

Нематоциди для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Нематем (Nematem), ВР (екстракт чорнобривців Tagetes spp. – 60%, екстракт водоростей Ascophyllum nodosum – 5%, Fe EDTA – 0,4%, Mn EDTA – 0,2%, Zn EDTA – 0,2%) Квімікас Мерістем (Químicas Meristem, S.L.), Іспанія	100 – 150 мл/100 м ²	Овочеві, плодові, ягідні культури	Галова нематода, мігруюча коренева нематода, яблунева галова нематода	Внесення у ґрунт	-	2 – 5 (з інтервалом 20 – 30 днів)



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Молюскоциди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Патруль, ГР (метальдегід, 60 г/кг) ТОВ-фірма «Агрохімпарк», Україна	20 – 30 кг/га	Капуста	Молюски (слимаки, равлики)	Локально, шляхом рівномірного поверхневого розсипання (у міжряддях та прикореневій зоні рослин). Початок біологічного впливу шкідника на культуру (відповідно до визначених порогів шкодочинності)	28	2
			Полуниця			14	2
		20 – 30 г/10 м ²	Прибудинкова територія		Локально, шляхом рівномірного поверхневого розсипання (у місцях перебування та пересування молюсків). Початок масової активізації цільових шкідників	-	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Молюскоциди для роздрібного продажу населенню

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Патруль, ГР (метальдегід, 60 г/кг) ТОВ-фірма «Агрохімпак», Україна	200 – 300 г/ 100 м ²	Капуста	Молюски (слимаки, равлики)	Локально, шляхом рівномірного поверхневого розсипання (у міжряддях та прикореневій зоні рослин). Початок біологічного впливу шкідника на культуру (відповідно до визначених порогів шкодочинності)	28	2
			Полуниця			14	2
		20 – 30 г/10 м ²	Прибудинкова територія		Локально, шляхом рівномірного поверхневого розсипання (у місцях перебування та пересування молюсків). Початок масової активізації цільових шкідників	-	2



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00

Родентициди

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Щелкунчик, (Лускунчик) ПР (бродіфакум, 0,05 г/кг (0,005%)) ТОВ «ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ «АГРО ПРОТЕКШН», Україна	10 – 25 г (1 – 2 столові ложки) / 5 м ²	Сільсько-господарські угіддя, складські приміщення, присадибні ділянки	Миші	Розкладання принади купками у місцях заселення гризунів, поблизу їх нір, на шляху просування	-	2 – 3
		50 – 100 г (5 – 10 столових ложок) / 10 м ²	Сільсько-господарські угіддя, складські приміщення, присадибні ділянки	Пацюки, сліпці та інші шкідливі гризуни	Розкладання принади купками у місцях заселення гризунів, поблизу їх нір, на шляху просування	-	2 – 3

Феромони

№ з/п	Назва препарату (діючої речовини) фірма, країна	Норма витрати препарату, (г, кг, л/га, м ² , т)	Культура, об'єкт, що обробляється	Об'єкт, проти якого обробляється	Спосіб, час обробок, обмеження	Строк останньої обробки, (в днях до збирання врожаю)	Максимальна кратність обробок
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Еводія (Evodia®), ЗП (8-метилдекан-2-ол пропаноат, 0,038 г/кг) Lithos Crop Protect GmbH (Літос Кроп Протек ГмбХ), Австрія	4,0 кг/га	Кукурудза	Західний кукурудзяний жук	Обприскування посівів незадовго до початку масового льоту шкідника і до кінця цвітіння (ВВСН 34-75)	-	1



Підписувач: Соболев Олексій Дмитрович
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000C79A0000A45F0700
Дійсний з 06.06.2025 12:32:00 по 06.06.2027 12:32:00